

Curriculum Operatorio del Chirurgo: **KHADER AZZAM**

Dal 14/05/2014 Al 31/08/2019

I Operatore

Blocco : *1 - BO VALDELSA*

Reperto : *0902 - CHIRURGIA GENERALE ELSA*

N. Posiz.	Data Int.	Paziente	Età	Nosologico	1° Diagnosi ICD-9-CM	1° Procedura Chirurgica ICD-9-CM
1	14/05/2014	3075	10 ANNI	2014003266	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): reperto di fimosi serrata.si procede alla circoncisione						
1	14/05/2014	3253	69 ANNI	2014003265	569.2 - STENOSI DEL RETTO E DELL'ANO	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI): Paziente in posizione ginecologica. Reperto di stenosi anale serrata postintervento di M-M eseguito in altra sede. Si esegue cauta dilatazione del canale anoretale. Controllo dell'emostasi e posizionamento di zaffo vaselinato nel canale anale.						
1	14/05/2014	2897	50 ANNI	2014003272	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale. Escissione di ragade anale ore 6						
1	14/05/2014	3254	59 ANNI	2014003276	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario circonferenziale sanguinate. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.						
1	21/05/2014	2904	50 ANNI	2014003450	569.1 - PROLASSO RETTALE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS Utilizzo di due kit PPH 001 per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e due emiborse posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo. Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto						
1	21/05/2014	2915	52 ANNI	2014003449	569.1 - PROLASSO RETTALE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS Utilizzo di due kit PPH 001 per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 punti a paracaduti anteriori e due posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo. Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto						
asportazione di polipo del retto						
1	21/05/2014	2911	50 ANNI	2014003446	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	28/05/2014	2918	71 ANNI	2014003621	569.1 - PROLASSO RETTALE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminosoprolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	28/05/2014	2934	60 ANNI	2014003608	569.1 - PROLASSO RETTALE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	28/05/2014	2932	43 ANNI	2014003606	569.1 - PROLASSO RETTALE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	28/05/2014	2913	43 ANNI	2014003609	569.1 - PROLASSO RETTALE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	29/05/2014	2996	68 ANNI	2014003640	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Incisione inguinale obliqua sn. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	29/05/2014	2919	75 ANNI	2014003646	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.22 - COLECISTECTOMIA
---	------------	------	---------	------------	---	-------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti infiammata, edematosa, distesa ed adesa alla parete addominale, con interposizione di omento. Si procede alla lisi laparoscopica delle aderenze omentali fino a liberare il fondo della colecisti. Con difficoltà si riesce a liberare l'infundibulo dalle aderenze senza tuttavia riuscire ad individuare le strutture dell'ilo colecistico. Si procede, pertanto, a convertire l'intervento a tecnica "open". Incisione sottocostale destra fino ad aprire il peritoneo. Colecistectomia retrograda resa difficoltosa dalle tenaci aderenze della colecisti stessa sul letto epatico e dalla difficoltosa identificazione di arteria e dotto cistico, che vengono isolate e sezionate tra clips metalliche. Controllo dell'emostasi mediante applicazione di falda di TachoSil sul letto colecistico. Toilette della cavità addominale. Drenaggio sottoepatico tipo Blake n.24. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	10/06/2014	3921	14 ANNI	2014003894	540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	------	---------	------------	---	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa del fondo.

Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo

1	11/06/2014	3131	80 ANNI	2014003916	154.1 - TUMORI MALIGNI DEL RETTO	48.63 - ALTRA RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO
---	------------	------	---------	------------	----------------------------------	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione dello pneumoperitoneo open periombelical e introduzione del trocar da 12mm ottico. Introduzione di ulteriori due trocar da 12mm in ipocondrio destro e fossa iliaca destra. Difficoltà ad esporre il piano aortico per la presenza di mesi ispessiti. I vasi mesenterici inferiori sono circondati da tessuto adiposo e linfatico spesso che non permette una dissezione esangue. Le anse intestinali sono dilatate con dolicosigma. Si rende necessaria pertanto conversione in chirurgia a cielo aperto.

Laparotomia mediana sovra ombelico pubica.

Il tumore è a carico del retto extraperitoneale. Isolamento dopo l'emergenza della colica sinistra dell'AMI e della VMI e loro sezione su lacci. Isolamento del sigma. Accesso al mesoretto posteriormente e liberazione dello stesso fino al piano degli elevatori, con estrema difficoltà data la dimensione del tumore e dalla pelvi stretta. Sezione del retto a valle della neoplasia con Echelon flex powered 60mm carica blu. Per difficoltà tecnica si decide per non confezionare l'anastomosi e procedere a resezione sec. Hartmann con colostomia terminale sinistra.

Controllo dell'emostasi con apposizione di emostatico fibrillare nello scavo pelvico. Tubo di drenaggio nella pelvi. Chiusura della laparotomia per piani.

Cute in filo.

1	11/06/2014	2927	29 ANNI	2014003944	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolapsate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Asportazione di marisca cutanea e cruentazione di ragade posteriore. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	11/06/2014	2948	31 ANNI	2014003947	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolapsate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	18/06/2014	2991	62 ANNI	2014004097	618.04 - RETTOCELE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	18/06/2014	4045	41 ANNI	2014004104	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vicryl, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	18/06/2014	3004	75 ANNI	2014003993	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolapsate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl tapotamp fibrillare sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	18/06/2014	2952	75 ANNI	2014004103	569.1 - PROLASSO RETTALE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica ,posizionamento di CAD 33 mm, presenza di prolasso emorroidario e rettale che supera la metà del CAD, posizionamento di 3 punti di trazione sulla emicirconferenza anteriore, valva tipo nigrasprud a protezione della parete posteriore del retto, valva vaginale anteriore, inserimento ed azionamento di suturatrice meccanica PPH03, punti di emostasi in Vicryl. Identica procedura sulla parete posteriore con PPH 01.controllo dell'emostasi con punti in vicryl .garza vaselinata in sede

1	25/06/2014	2960	6 ANNI	2014004262	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	------	--------	------------	------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di fimosi sewrrata .si procede alla circoncisione .emostasi

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	25/06/2014	3018	68 ANNI	2014004263	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con Secure-Strap. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
1	25/06/2014	2896	52 ANNI	2014004270	455.3 - EMORROIDI ESTERNE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	16/07/2014	3016	47 ANNI	2014004763	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO): Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.						
1	16/07/2014	2953	72 ANNI	2014004764	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	16/07/2014	2903	45 ANNI	2014004765	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Incannulamento di 2 orifizi cutanei ascessualizzati perianale ad ore 8 e ore 9, introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore di orificio interno a livello del canale anale di fistola rettilinea transfinterica visualizzata con il blue di metetelene. Fistulectomia parziale con il setone elastico a drenare. Emostasi. Sutura cutanea parziale.garza iodoformica in sede.						
1	16/07/2014	3000	71 ANNI	2014004766	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO): Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.						
1	17/07/2014	3034	45 ANNI	2014004788	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS Utilizzo di due kit PPH 001 per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e due emiborse posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo. Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto						
1	20/07/2014	4821	67 ANNI	2014004868	540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa .

Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Drenaggio .Cute in filo

1	23/07/2014	3049	58 ANNI	2014004921	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, garza vaselinata nel canale anale. Escissione di marische.

1	24/07/2014	2989	44 ANNI	2014004968	618.04 - RETTOCELE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 35mm caricabianca, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	24/07/2014	3137	41 ANNI	2014004970	618.04 - RETTOCELE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 35mm carica bianca, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	24/07/2014	3135	50 ANNI	2014004971	618.04 - RETTOCELE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 35mm carica bianca si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	30/07/2014	3073	7 ANNI	2014005097	605 - PREPUZIO E SUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	------	--------	------------	-------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Escissione di anello di prepuzio fimotico. controllo dell'emostasi e sutura radiale con punti staccati riassorbibili. Medicazione con gentalyne e Emla .

1	30/07/2014	1873	43 ANNI	2014005099	618.04 - RETTOCELE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	30/07/2014	3079	62 ANNI	2014005100	618.04 - RETTOCELE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	30/07/2014	3249	71 ANNI	2014005101	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	------	---------	------------	----------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di stenosi anale con ragade anale posteriore e ipertono sfinteriale si procede alla divulgazione del canale anale.escissione della ragade.emostasi garza vaselinata in sede

1	31/07/2014	3159	34 ANNI	2014005125	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.

1	06/08/2014	3150	54 ANNI	2014005262	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.51 - RIPARAZIONE DI CISTOCELE
---	------------	------	---------	------------	---	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con sutura continua in PDS 2/0. Preparazione del tunnel propteritoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico in Vicryl 2/0. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di discreto rettocele di 5cm circa sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	06/08/2014	1847	43 ANNI	2014005263	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario.
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, cauterizzazione di regade anale posteriore ore 6, tampone vaselinato nel canale anale.

1	06/08/2014	3584	63 ANNI	2014005264	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario asimmetrico più preponderante e destra. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Tampone vaselinato nel canale anale.

1	11/08/2014	4817	70 ANNI	2014004321	518.82 - ALTRE INSUFFICIENZE POLMONARI, NON CLASSIFICATE ALTROVE	31.1 - TRACHEOSTOMIA TEMPORANEA
---	------------	------	---------	------------	--	---------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di insufficienza respiratoria in paziente con pregressa tracheostomia per insufficienza respiratoria cronica e esito di ictus .si procede alla tracheostomia chirurgica.

1	13/08/2014	3448	50 ANNI	2014005412	618.04 - RETTOCELE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	13/08/2014	3664	55 ANNI	2014005417	618.04 - RETTOCELE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.in paziente operata per prolassectomia secondo longo 18 mese fa altrove con legature per emorroide residue

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	13/08/2014	3165	53 ANNI	2014005418	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .con polipi del retto e noduli emorroidari esterni Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale. asportazione di polipi rettale con escissione dei noduli esterni con legature.emostasi

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	13/08/2014	4078	42 ANNI	2014005422	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	13/08/2014	3666	24 ANNI	2014005420	565.0 - RAGADE ANALE	49.04 - ALTRA ASPORTAZIONE DI TESSUTI PERIANALI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): reperto di ragade anale posteriore ore 6 recidiva si procede alla divulgazione del canale anale con cauterizzazione del fondo della ragade .emostasi						
1	20/08/2014	3727	73 ANNI	2014005538	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI): Posizione litotomica ed evidenza di perineo discendente, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.						
1	20/08/2014	4081	46 ANNI	2014005539	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circonferenziale. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.						
1	20/08/2014	4076	49 ANNI	2014005540	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.						
1	20/08/2014	3171	66 ANNI	2014005550	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril. Cauterizzazione di ragade anale posteriore ad ore 6. Tampone vaselinato nel canale anale.						
1	02/09/2014	3033	62 ANNI	2014005841	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale con gemizio ematico ad ore 6. Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizionamento di zaffo endoretale .						
1	03/09/2014	3312	44 ANNI	2014005879	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): reperto di polipo del canale anale con nodulo emorroidario esterno alle ore 7 si procede alla asportazione del polipo con l'escissione del nodulo emorroidario esterno.emostasi						
1	03/09/2014	3087	41 ANNI	2014005877	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	03/09/2014	3391	76 ANNI	2014005876	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colectomia. Controllo dell'emostasi. drenaggio. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	03/09/2014	5691	41 ANNI	2014005894	569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO	46.75 - SUTURA DI LACERAZIONE DELL'INTESTINO CRASSO
---	------------	------	---------	------------	--------------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per introdurre trocar da 12 mm in sede periombelicale e sotto visione di 2° e 3° trocar in sede sovrapubica e fianco sn da 5 mm. Presenza di abbondante quantità di liquido tipo acqua di fagioli nel Douglas in doccia parietocolica dx e sn e tra le anse, si esegue aspirazione per prelievo culturale.

Esplorazione dei visceri senza riuscire ad identificare la noxa per cui si esegue conversione in laparotomia ombelico-pubica, apertura della cavità addominale, esplorazione negativa di tutte le anse del tenue della pelvi e della loggia sovramesocolica per quanto valutabile. L'esplorazione del colon mette in evidenza a livello del sigma distale di un'area malacica di circa 3 cm nella cui parte centrale si apprezza modesta fuoriuscita di liquido alla digitopressione in assenza di secrezioni fecali.

Si esegue rafia in duplice strato di vicryl a punti staccati affondando trasversalmente su viscere sano l'area malacica. Accurata toilette addominale con fisiologica calda e betadine diluito. Posizionamento di due drenaggi tipo Blake n° 24 in fianco sn a drenare la pelvi ed in sede sovrapubica a drenare la doccia parietocolica dx e la sede sovraepatica. Chiusura a strati della parete addominale mediante punti staccati di vicryl, sottocute in monocryl e cute in nylon 4/0.

Al termine si esegue esplorazione rettale con divulsione anale ottenendo abbondante fuoriuscita di feci liquide.

1	04/09/2014	5696	77 ANNI	2014005891	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
---	------------	------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di ernia inguino scrotale permagna con perdita di diritto di domicilio si procede alla Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, e sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in punti metallici reperto di idrocele destro con ciste sierosa del epididimo destro. eversione della tunica vaginale. emostasi. drenaggio dello scrotop destro

1	04/09/2014	3087	41 ANNI	2014005877	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

posizionamento di cad con dimostrazione di gemizio ematico in corrispondenza del tratto di sutura circolare tra ore 5 e ore 7. Si procede ad emostasi con punti transfissi in Vycril 2/0 con arresto della proctorragia. Zaffo vasellinato in sede endoanale.

1	08/09/2014	5776	58 ANNI	2014005988	540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	------	---------	------------	--	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa del fondo. con ascesso appendicolare. si invia il liquido ascessuale all'esame batteriologico

Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. drenaggio. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo

1	10/09/2014	3392	55 ANNI	2014006040	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario.

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall'apice delle emorroidi. Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	10/09/2014	4399	74 ANNI	2014006038	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario.

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall'apice delle emorroidi. Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	10/09/2014	4236	70 ANNI	2014006039	455.4 - EMORROIDI ESTERNE TROMBIZZATE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di maresche cutanee			
1	13/09/2014	5914	70 ANNI	2014006112	550.00 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,CON GANGRENA	53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			incisione inguinale destra reperto di ernia inguinale obliqua esterna incarcerata a livello del canale inguinale con sacco erniario contenete tessuto adiposo necrotico gangrenoso verosimilmente l'appendicite necrotica impegnata nel sacco erniari liberato e dissezionato fino all' interno della cavita addominale. reso necessaria la esplorazione addominale. Laparatomia ombelico pubica in corrispondenza della recente ferita chirurgica.esplorazione addominale controllo dei viscere addominale.asportazione dei tessuti necrotici impegnati nel sacco erniario .sutura a ponte staccate del cieco dove appare un area circoscritta di sofferenza ischemica .appendicectomia. emostasi sutura della parete addominale plastica dell ernia inguinale destra con rete di prolene.emostasi sintesi dei tessuti cuti in filo			
1	16/09/2014	5352	67 ANNI	2014006172	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.			
1	17/09/2014	4981	15 ANNI	2014006191	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in seta			
1	17/09/2014	4557	56 ANNI	2014006200	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa litiasica con pareti ispessite isolamento e sezione su clips del dotto cistico che appare lievemente ectasico e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.			
1	24/09/2014	4340	38 ANNI	2014006367	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.79 - ALTRA RIPARAZIONE DEL RETTO
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):			Reperto di rettocele di 4-5 cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto			
1	24/09/2014	3311	56 ANNI	2014006372	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.79 - ALTRA RIPARAZIONE DEL RETTO
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):			Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto			
1	24/09/2014	3309	38 ANNI	2014006371	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
asportazione di polipo del canale anale

1	28/09/2014	6266	76 ANNI	2014006449	568.81 - EMOPERITONEO (NON TRAUMATICO)	54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA
---	------------	------	---------	------------	--	---------------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Incisione xifosottombelicale. All'apertura della cavità peritoneale presenza di sangue scuro, in assenza di coaguli, che si aspira (circa 500 ml).
L'esplorazione dei visceri addominali risulta negativa per lesioni traumatiche. Il fegato destro presenta aspetto a noce moscata con lacerazione di circa 3 cm a livello della cupola epatica a destra (6°-7°segmento epatico) da cui fuoriesce sangue fluido, scuro senza evidenza di coaguli, in continuità con una cavità intraepatica collassata per la fuoriuscita del suo contenuto ematico in addome. Si aspira tutto il liquido ematico presente in addome e si lava abbondantemente con soluzione fisiologica e betadine. Ulteriore controllo dell'emostasi del fegato posizionando falda di fibrillare. Posizionamento di due drenaggi tipo Blake n.24 sopra e sottopeatico. Chiusura della parete per strati. Cute in filo.

1	01/10/2014	5736	35 ANNI	2014006524	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	------	---------	------------	--------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

In posizione litotomica si evidenzia all'anoscopia polipo del canale anale ad ore 8 e all'ipesezione nodulo emorroidario trombizzato ore 4. Con Ligasure si asportano le due lesioni (il polipo viene inviato per esame istologico), controllo dell'emostasi. Garza vaselinata nell'ano.

1	01/10/2014	4874	43 ANNI	2014006521	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone nel canale anale.

1	01/10/2014	4977	53 ANNI	2014006518	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	08/10/2014	4369	75 ANNI	2014006677	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per posizionare il trocar diagnostico ombelicale.
Sotto visione si posizionano i due trocar operativi in fianco dx e sin.
Previo posizionamento di tampone in vagina si espone la cupola vaginale; apertura del peritoneo della cupola e ancoraggio della rete in prolene;mediante utilizzo di pinza curva introdotta a livello della spina iliaca anterosuperiore si esegue tunnel sottoperitoneale sino ai due estremi laterali della cupola vaginale per ancorare la rete in prolene che viene trazionata e ancorata alla fascia del musc. obliquo esterno bilateralmente.
Chiusura degli accessi, cute in nylon.Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	08/10/2014	6334	71 ANNI	2014006666	619.1 - FISTOLA ENTERO-GENITALE,FEMMINILE	46.52 - CHIUSURA DI ORIFIZIO ARTIFICIALE DELL'INTESTINO CRASSO
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di colonstomia sn temporanea .si procede alla mobilitazione del moncone prossimale e distale.liberazione fino alla cavita peritoneale
chiusura della colonstomia mediante echilon 60 con carica blue.emostasi .chiusura della parete addominale a strati.con vicryl e loop in pds.sintesi dei tessuti cute in nylon

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1 08/10/2014 133

47 ANNI 2014006681 618.04 - RETTOCELE

70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione sulla linea mediana. Dopo scollamento della vescica si effettua doppia borsa di tabacco. Cistouretropessi.
Plastica vaginale anteriore.

Correzione del rettocele. Plastica vaginale posteriore in paziente operata per prolassectomia altrove

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1 14/10/2014 5956

51 ANNI 2014006824 574.21 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA
MENZIONE DI COLECISTITE,CON OSTRUZIONE

51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di poliposi con microlitiasi della coleciste isolamento e sezione su clips del dotto cistico che appare lievemente ectasico e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecche per piani. Cute in filo.

1 15/10/2014 4850

60 ANNI 2014006855 618.04 - RETTOCELE

70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1 15/10/2014 5129

56 ANNI 2014006860 565.0 - RAGADE ANALE

49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE
LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO**Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):**

reperto di ragade anale posteriore fistolizzata. divulgazione del canale anale escissione della ragade anale .emostasi

1 15/10/2014 5054

36 ANNI 2014006863 455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
COMPLICAZIONI

49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1 15/10/2014 4881

68 ANNI 2014006867 455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA
MENZIONE DI COMPLICAZIONI

49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1 22/10/2014 5657

71 ANNI 2014007020 618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O
ACQUISITO

70.92 - ALTRI INTERVENTI SUL CUL-DE-SAC

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione ombelico pubica.lisi adernziale .reperto di enterocele con col de sac.si procede alla mobilizzazione del retto a livello del promonrrio scrale che viene liberato .si mobilizza la vagina con incisione trasversale liberando la parete posteriore .posizionamento la rete di prolene larga 4cm e lunga 9 cm con sutura a punte staccate sulla paret posteriore vaginale a sua volta viene fissata sul promontorio sacrale.si procede alla peritonizzazione coprendo la rete di prolene per tutta la sua lunghezza con il retto mobilizzato .emostasi .sintesi dei tessuti

1 22/10/2014 5013

34 ANNI 2014007031 455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
COMPLICAZIONI

49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice.escissione di ragade anale. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1 29/10/2014 5011

44 ANNI 2014007197 455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE
COMPLICAZIONI

49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.

1	29/10/2014	4216	45 ANNI	2014007202	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Tampone vaselinato nel canale anale.

1	29/10/2014	4976	51 ANNI	2014007198	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.

1	29/10/2014	5011	44 ANNI	2014007197	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di proctorragia in paz operato per prolassectomia secondo Longo.lieve gemizio dell anastomosi .emostasi .controllo della sutura nella norma.zaffo vasellinato con fibrillare in sede

1	30/10/2014	4786	5 ANNI	2014007224	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	------	--------	------------	------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Si procede ad escissione di anello di prepuzio fimotico. controllo dell'emostasi e sutura radiale con punti staccati riassorbibili in Vicryl Rapid.
ACQUISITO

1	05/11/2014	4136	69 ANNI	2014007398	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.79 - ALTRA RIPARAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione ombelicale in open si procede al pneumoperitoneo con l'introduzione di trocar 11mm in fossa iliaca destra e del 5mm in fossa iliaca dx e del 5 bmm osrapubico.reoerto di numerosi anse ileale dal pregresso intervento di isterectomia..lisi aderenziale si procede alla mobilizzazione del retto a livello del promontorio sacrale fino al retto sotto peritoneale.

mobilizzazione della cupola vaginale su di un tampone su pinza liberazione di tutta la parete posteriore vaginale con posizionamento di rete di prolene 10x4fissata con la parete posteriore con 2 suture continue in PDS 3zeri-fissaggio della rete sul promontorio sacrale con securstarap.peritonizzazione della breccia con il meso rettosigma .emostasi.sintesi dei tessuti chiusura dei fori di trocars.

1	05/11/2014	4853	80 ANNI	2014007401	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso.STARR secondo longo con doppia PPH 03 parete rettale anteriore e 01 parete posteriore .emostasi .sintesi dei tessuti.
zaffo di garza vasellinata in sede

1	05/11/2014	4788	44 ANNI	2014007402	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03.... e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	12/11/2014	4982	68 ANNI	2014007543	550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua dx sulla precedente cicatrice.reperto di ernia inguinale obliqua esterna recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. recidiva Isolamento del sacco erniario e sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	12/11/2014	4935	35 ANNI	2014007546	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
---	------------	------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione ombelicale in open si procede allo pneumoperitoneo.sotto visione si introducono9 il II trocar e il III trocar in fossa iliaca destra e sinistra.reperto di cistocele .si apre il peritoneo vaginale sulla parete anteriore della vagina dove viene introdotta una rete di prolene a V con sutura della v sulla parete vaginale estesa con tampone vaginale .tunilizzazione delle branche della rete da un incisione sopra la spina iliaca bilateralmente con passaggio a livelle extra peritoneale a vista con la telecamera fino alla parete vaginale -peritonizzazione .emostasi sintesi dei tessuti

1	12/11/2014	4789	45 ANNI	2014007555	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	07/11/2014	6466	86 ANNI	2014007443	153.2 - TUMORI MALIGNI DEL COLON DISCENDENTE	45.75 - EMICOLECTOMIA SINISTRA
---	------------	------	---------	------------	---	--------------------------------

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione del pneumoperitoneo mediante accesso open peri-ombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sotto visione un secondo e terzo in ipocondrio dx e fossa iliaca dx. Reperto di tatuaggio del colon discendente che affiora alla sierosa peritoneale. Apertura del legamento gastro-colico e liberazione della flessura sx e tutto il trasverso medio-distale. Isolamento della vena mesenterica inferiore all'origine e apertura del retroperitoneo seguendo la fascia di Toldt. Isolamento all'origine dell'arteria mesenterica inferiore e sua sezione mediante Echelon Flex Powered 60 mm carica vascolare e della vena mediante posizionamento di Em-O-Lok. Lisi della doccia parieto-colica sx e liberazione del retto intraperitoneale. Sezione con Echelon Flex Powered 60 mm carica tissutale blu del retto immediatamente sotto al promontorio. Mini-laparotomia mediana sovrapubica. Estrazione del pezzo previo posizionamento di protezione di parete, sezione del colon a livello della flessura su rastrello e quindi introduzione della testina di una Stapler 29. Chiusura della mini-laparotomia e re-induzione del pneumoperitoneo. Anastomosi colo-rettale sec. Knight e Griffen. Drenaggio in prossimità dell'anastomosi. Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.

1	18/11/2014	6885	40 ANNI	2014007676	569.1 - PROLASSO RETTALE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.in paziente operata pewr prolassectomia secondo Longo in altra sede 5 anni fa Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	19/11/2014	5461	65 ANNI	2014007701	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circonferenziale di III grado. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Presenza di ragade anale ad ore 6 che viene asportata. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.

1	19/11/2014	5375	63 ANNI	2014007703	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

paziente baraplegico in Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura con grande difficolta tecnica per contrazione mioclonici dello sfinteri anale , reperto di prolasso emorroidario di IV grado. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, escissione con il Legasure delle mareshe cutanee.tampone riassorbibile nel canale anale.

1	26/11/2014	7447	18 ANNI	2014007880	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	------	---------	------------	------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Previa anestesia locale, si procede ad escissione di anello di prepuzio fimotico. controllo dell'emostasi e sutura radiale con punti staccati riassorbibili.

1	26/11/2014	7053	85 ANNI	2014007877	569.2 - STENOSI DEL RETTO E DELL'ANO	96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
---	------------	------	---------	------------	--------------------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Stenosi serrata del canale anale. Divulsione anale, escissione di mariche cutanee. Zaffo vaselinato nel canale anale

1	26/11/2014	5278	41 ANNI	2014007881	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.
Previa divaricazione della parete vaginale si reperta polipo penducolato dell'esocervice ad ore 4 che viene asportato. controllo dell'emostasi e posizionamento di garza betadinata in sede. (Dott.ssa Ferretti)

1	26/11/2014	4787	49 ANNI	2014007876	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.

1	26/11/2014	5276	52 ANNI	2014007873	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	27/11/2014	6882	67 ANNI	2014007924	569.1 - PROLASSO RETTALE	70.52 - RIPARAZIONE DI RETTOCELE
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	03/12/2014	5734	63 ANNI	2014008055	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.79 - ALTRA RIPARAZIONE DEL RETTO
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° .4 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	03/12/2014	5653	65 ANNI	2014008052	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	------	---------	------------	--------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di stenosi anale serrata, si procede alla divulsione del canale anale con massaggio sfinteriale per apprezzare lesione ulcerata infiltrante sanguinante della regione ano-rettale ad ore 11- Si procede alla biopsia escissionale della neoformazione per esame istologico. Esplorazione del retto inferiore con reperto di 2 neoformazione di consistenza fibrosa a superficie liscia con mucosa rettale apparentemente integra a distanza di 4-5 cm dal margine anale interno ad ore 2-3. Emostasi, zaffo vasellinato in sede.

1	03/12/2014	5654	25 ANNI	2014008061	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	07/12/2014	7875	73 ANNI	2014008101	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx.reperto di colecistite acuta gangrenosa distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi con Fibrillare. Chiusura delle brecche per piani.Drenaggio Cute in filo.

1	10/12/2014	6150	42 ANNI	2014008189	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso.STARR secondo lungo con transtar
scomposizione del prolasso in ant.e posteriore
resezione del rettocele con la TRANSTAR con echilon e 6 caricatore.emostasi garza vasellinata in sede.
asportazione di polipi iperplasiogene del anorett

1	10/12/2014	5703	48 ANNI	2014008192	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.+asportazione di polipo del retto con escissione ragade anale

1	10/12/2014	7969	36 ANNI	2014008203	532.10 - ULCERA DUODENALE ACUTA CON PERFORAZIONE, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	44.42 - SUTURA DI ULCERA DUODENALE
---	------------	------	---------	------------	--	------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale sn posizionando un trocar da 12 mm e sotto visione altro trocar da 12 mm in
ipocondrio sn e da 5 mm ion fianco dx. Reperto di discreta quantità di liquido biliare in cavità e di fibrina per la presenza di piccolo foro a livello della
parete superoposteriore della prima porzione duodenale che risulta attratta sull'ilo della colecisti. Lisi di tale aderenza per permettere la lussazione della
parete posteriore. Posizionamento di doppio punto in Vicryl 2/0 a X. Prova di tenuta con blu di metilene con esito negativo per spandimento del contenuto
gastrico. Toilette della cavità peritoneale e posizionamento di tubo di drenaggio sottoepatico tipo Blake n.24. Chiusura degli accessi da 12 mm per strati.
Cute in filo.

1	15/12/2014	7519	75 ANNI	2014008291	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.

1	05/01/2015	8322	71 ANNI	2015000041	560.81 - ADERENZE INTESTINALI O PERITONEALI CON OCCLUSIONE (POSTOPERATORIO) (POSTINFETTIVO)	54.59 - ALTRE LISI DI ADESIONI PERITONEALI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

iNCISIONE MEDIANA SOVRA-SOTTOOMBELICALE. ALLA APERTURA DELLA CAVITÀ PERITONEALE SI DIMOSTRA LA PRESENZA DI
NUMEROSE ADERENZE CHE ANGOLANO IL DIGIUNO E LE PRIME ANSE ILEALI E ABBONDANTE LIQUIDO SIEROSO . SI
PRELEVANO CAMPIONI DI TALE LIQUIDO PER ESAME COLTURALE E BATTERIOLOGICO . LE ANSE APPAIONO DISTESE MA NON
SOFFERENTI. TENACI ADERENZE IN PARTICOLARE IN FOSSA ILIACA SINISTRA E NELLO SCAVO PELVICO, IN CORRISPONDENZA
DELLA ANASTOMOSI COLORETTALE ESITO DEL PRECEDENTE INTERVENTO . RICOSTRUZIONE DEL PIANO SIEROSO DI UNA ANSA
ILEALE INTERESSATA. . IN FOSSA ILIACA DX SI REPERTA APPENDICITE ACUTA CON ADERENZA TRA LA PUNTA FLEMMONOSA
ED UNA DELLE ULTIME ANSE ILEALI DISTALI- ADESIOLISI ED APPENDICECTOMIA PER VIA RETROGRADA CON CHIUSURA DEL
MONCONE APPENDICOLARE SU DOPPIO LACCIO IN VICRYL. - ISPEZIONE DELLA CAVITA' PERITONEALE E MANUALE DELLA
SUPERFICIE DEL FEGATO CHE APPAIONO ESENTI DA RIPRESA DI MALATTIA NEOPLASTICA .
POSIZIONAMENTO DI DRENAGGIO DI TIPO BLAKE DRAIN 24 IN PELVI E FOSSA ILIACA DX .
RICOSTRUZIONE DEL PIANO PERITONEALE E DELLA FASCIA IN VICRYL CONTRO REALASE . SUTURA DELLA CUTE IN NYLON .-

1	07/01/2015	5772	52 ANNI	2015000112	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, escissione di ragade anale ore 6 con diatermocoagulazione, tampone vaselinato nel canale anale.

1	14/01/2015	5769	70 ANNI	2015000300	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in punti metallici

1	14/01/2015	8079	68 ANNI	2015000257	154.1 - TUMORI MALIGNI DEL RETTO	48.63 - ALTRA RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO
---	------------	------	---------	------------	----------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione dello pneumoperitoneo con ago di Verres in ipocondrio sn. Posizionamento di trocar da 12 mm periombelicale destro sotto visione ottica. Posizionamento di altri due trocar: da 12mm in fossa iliaca destra e da 5 mm in ipocondrio destro. Ispezione della cavità addominale negativa per localizzazioni secondarie peritoneali, presenza di neoplasia affiorante alla sierosa a livello del giunto retto-sigma, con tatuaggio endoscopico immediatamente a valle. Apertura del retroperitoneo sul piano aortico, sezione dell'AMI all'origine su echelon 60 mm e della VMI sullo stesso piano anch'essa. Dissezione della fascia di Toldt sul Gerota in senso medio-laterale fino alla doccia parieto-colica. Si posiziona ulteriore trocar da 5 mm in fossa iliaca sinistra. Apertura del piano mesoretale e preparazione del retto a valle della neoplasia. Sezione dello stesso con Echelon flex Powered 60mm carica blu. Minilaparotomia sec. Pfannenstiel. Protezione della parete con Lap Disc. Estrazione del colon, sezione su rastrello a livello del passaggio discendente-sigma e posizionamento al suo interno della testina della stapler 29 mm. Reintroduzione del colon residuo in addome, chiusura della breccia per piani e reinduzione dello pneumoperitoneo. Colo-retto anastomosi meccanica transanale sec. Knight-Griffen con ECS 29mm. Controllo dell'emostasi. Posizionamento di drenaggio tipo Blake 24 Fr nel Douglas. Chiusura delle brecce dei trocars. Cute in filo.

1	14/01/2015	5657	71 ANNI	2015000241	789.09 - DOLORE ADDOMINALE DI ALTRE SEDI SPECIFICATE	54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA
---	------------	------	---------	------------	--	---------------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Incisione mediana ombelico-pubica sulla pregressa cicatrice chirurgica. Si evidenziano e si isolano le due branche, dx e sn, della mesh in prolene posizionata nel precedente intervento di POPS. Rimozione delle stesse e loro invio ad esame istologico ricostruendo il piano dei legamenti rotondi. Controllo dell'emostasi, viscerolisi. Chiusura della parete a strati. Cute in filo

1	21/01/2015	5176	44 ANNI	2015000530	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Asportazione di marishe cutanee. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	21/01/2015	5987	39 ANNI	2015000528	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	21/01/2015	5902	44 ANNI	2015000525	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	22/01/2015	8716	31 ANNI	2015000560	540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	------	---------	------------	---	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

INDUZIONE DI PNEUMOPERITONEO MEDIANTE ACCESSO OPEN PERIOMBELICALE, POSIZIONAMENTO DI TROCAR DA 11 MM E SOTTO VISIONE DI 2° E 3° TROCAR DA 5 MM RISPETTIVAMENTE IN FIS E SOVRAPUBICO. REPERTO DI APPENDICITE ACUTA.SEZIONE DEL MESENTERIOLO APPENDICOLARE MEDIANTE PINZA BIPOLARE. APPENDICECTOMIA CON CHIUSURA DEL MONCONE SU DOPPIO LACCIO.CONTROLLO EMOSTASI. CHIUSURA BRECCIA OMBELICALE IN PDS .CUTE IN FILO

1	26/01/2015	6279	37 ANNI	2015000661	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	---------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica ,posizionamento di CAD 33 mm, presenza di prollasso emorroidario e rettale che supera la metà del CAD, posizionamento di 3 punti di trazione sulla emicirconfenza anteriore, valva tipo nigrasprud a protezione della parete posteriore del retto, valva vaginale anteriore, inserimento ed azionamento di suturatrice meccanica PPH01, punti di emostasi in Vycril. Identica procedura sulla parete posteriore.

1	28/01/2015	6709	34 ANNI	2015000747	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.aspoprtazione di polipo del retto

1	28/01/2015	6470	44 ANNI	2015000753	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	28/01/2015	8611	49 ANNI	2015000750	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 6cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	29/01/2015	6311	55 ANNI	2015000793	618.04 - RETTOCELE	48.69 - ALTRA RESEZIONE DEL RETTO
---	------------	------	---------	------------	--------------------	-----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione ombelicale.si procede al pneumo peritoneo con l'introduzione del primo trocar sotto visione si introducono il II° ed il III° .trocar in corrispondenza della fossa iliaca destra e sinistra.reperto di voluminoso prollasso vaginale esterno con cistocele di III grado.si apre il peritoneo in corrispondenza della riflessione vescico vaginale sulla parete anteriore si sutura l 'angolo della rete 30,x30cm e si estraggono le branche della rete a 2cm sopra la spine iliache esterne attraverso una piccola cutanea trasversa passando extra il peritoneo sotto visione laparoscopica .sutura e peritonizzazione .
sintesi dei tessuti.

reperto di voluminoso rettocele .si procede alla Starr secondo Longo con la Transtar scomponendoda prima il prollasso con 6 ounti a paracadute.si scompone il prollasso con echilon 60 .resezione con la transtar utilizzando 7 caricatori.emostasi zaffo vasellinato in sede.

1	03/02/2015	8706	70 ANNI	2015000874	153.3 - TUMORI MALIGNI DEL SIGMA	45.75 - EMICOLECTOMIA SINISTRA
---	------------	------	---------	------------	----------------------------------	--------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo mediante accesso open peri-ombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sotto visione un secondo e terzo in ipocondrio dx e fossa iliaca dx. Reperto di neoplasia stenosante del sigma che affiora alla sierosa peritoneale. Posizionamento di un quarto trocar in fianco sx per aprire il legamento gastro-colico e liberare la flessura sx e tutto il trasverso medio-distale. Isolamento della vena mesenterica inferiore all'origine e apertura del retroperitoneo seguendo la fascia di Toldt. Isolamento all'origine dell'arteria mesenterica inferiore e della vena, sezione di entrambi i vasi con Endo-gia vascolare. Lisi della doccia parieto-colica sx e liberazione del retto intraperitoneale. Sezione con Endo-gia tissutale carica verde del retto poco sopra la riflessione peritoneale pelvica. Mini-laparotomia mediana sovrapubica. Estrazione del pezzo, sezione del colon a livello della flessura su rastrello e quindi introduzione della testina di una Stapler 29. Chiusura della mini-laparotomia e re-induzione del pneumoperitoneo. Anastomosi colo-rettale sec. Knight e Griffen. Drenaggio in prossimità dell'anastomosi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	04/02/2015	6821	50 ANNI	2015000926	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prollassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	04/02/2015	6015	31 ANNI	2015000921	455.6 - EMORROIDI NON SPECIFICATE SENZA MENZIONE DI COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prollassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Punti di emostasi sulla linea di sutura in Vicryl. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	11/02/2015	6472	79 ANNI	2015001110	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): reperto di fistola perianale posteriore mediana su di ragade anale incannulamento della fistola con l'individuazione degli orifizi interno ed esterno fistolectomia con escissione della ragade anale.emostasi zaffo iodoformico in sede						
1	18/02/2015	7113	65 ANNI	2015001318	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	18/02/2015	6958	50 ANNI	2015001327	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	18/02/2015	6790	60 ANNI	2015001328	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di ragade anale posteriore						
1	24/02/2015	9418	30 ANNI	2015001470	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Reperto di ragade anale posteriore acuta con ipertono sfinteriale si procede alla escissione di ragade anale con divulgazione del canale anale						
1	24/02/2015	8409	67 ANNI	2015001472	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico a simmetrico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	25/02/2015	6884	41 ANNI	2015001500	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	28/02/2015	9499	44 ANNI	2015001556	566 - ASCESSO ANALE E RETTALE	49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): reperto di ascesso perianale sn si procede alla incisione e drenaggio .lavaggio con H2O2 e Amukina.zaffo iodoformico in sede						
1	04/03/2015	7300	55 ANNI	2015001677	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale destro. Posizionamento di un trocar da 12mm e sotto visione di altri 2 trocars uno da 12 mm in fianco destro, l'altro da 5 mm in fianco sinistro. Individuata la parete vaginale sul fornice anteriore si apre il peritoneo per uno spazio sufficiente all'alloggiamento della mesh. Controllo dell'emostasi ed introduzione di mesh in prolene adeguatamente sagomata. Suo ancoraggio alla parete della vagina con PDS 2/0 in continua con fissaggio della stessa con Lapra-Ty. Incisione a livello delle spine iliache anterosuperiori bilateralmente fino ad individuare la fascia del muscolo obliquo esterno, sua incisione e creazione dello spazio properitoneale fino a giungere in comunicazione con l'apertura del peritoneo sulla parete vaginale da entrambe i lati, eseguita in precedenza, sottopassando il legamento rotondo bilateralmente. Trazione delle branche della mesh ancorando la vagina bilateralmente alla fascia del muscolo obliquo esterno. Controllo del corretto posizionamento della mesh in laparoscopia e chiusura del peritoneo in continua con Stratafix 2/0. Controllo dell'emostasi, chiusura degli accessi dei trocars da 12 mm per strati. cute in filo. Posizionata la paziente in posizione litotomica si procede a Transtar con scomposizione del prolasso ad ore 3 e 9 mediante Echelon Flex 60 carica verde. Resezione del prolasso con Contour Trastar 6 cariche. Controllo dell'emostasi mediante applicazione di punti transfissi in Vicryl 2/0. Zaffo vaselinato nel canale anale.

1	04/03/2015	7325	40 ANNI	2015001679	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	04/03/2015	7182	49 ANNI	2015001681	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	11/03/2015	7082	49 ANNI	2015001838	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa con pareti ispessite isolamento e sezione su clips del dotto cistico che appare lievemente ectasico e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	11/03/2015	7283	76 ANNI	2015001847	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

induzione lenta del pneumoperitoneo medianta accesso ombelicale open.posizionamento del primo troar 12mm sotto visione di altri due trocar di 12,e di 5mmli aderenziale dal pregresso intervento si individua la parete vaginale mediante un divaricatore aperto il peritoneo vaginale si posiziona mesh di prolene adeguatamente sagomata e si sutura l'engolo della rete utilizzando il laparo-ty estraendo le due brannmche della rete da due incisione sopra la spina iliaca superiore bilateralmente fissandoli alla fascia del muscolo obliquo esterno emostasi e controllo del buo posizionamento e la tensione delle branche bilateralmente.chisura delle accessi cute in filo
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	11/03/2015	6019	36 ANNI	2015001848	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	18/03/2015	6716	59 ANNI	2015002017	618.04 - RETTOCELE	46.99 - ALTRI INTERVENTI SULL'INTESTINO
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di discreto rettocele di 5cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 (5+1) ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	18/03/2015	7207	49 ANNI	2015002021	569.1 - PROLASSO RETTALE	46.99 - ALTRI INTERVENTI SULL'INTESTINO
---	------------	------	---------	------------	--------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di discreto rettocele asimmetrico con componente posteriore prevalente di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 7 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 (6+1) ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	18/03/2015	7457	48 ANNI	2015002018	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	25/03/2015	7724	42 ANNI	2015002154	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Reperto di rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45 mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	01/04/2015	7496	44 ANNI	2015002366	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	01/04/2015	7358	44 ANNI	2015002367	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	------	---------	------------	----------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale con gemizio ematico ad ore 6. Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizionamento di zaffo endoretale .
reperto dsi fistola perianale posteriore sulla ragade anale.fistolectomia emostasi .garza vasellinata in sede

1	01/04/2015	7557	48 ANNI	2015002369	564.02 - COSTIPAZIONE CON DISFUNZIONE DELLO SBOCCO	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	---	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n°7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	01/04/2015	7670	49 ANNI	2015002368	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	08/04/2015	7937	20 ANNI	2015002531	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale racemosa . Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in Nylon 2\0.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	08/04/2015	7771	43 ANNI	2015002532	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Reperto di discreto rettocele di 4.5cm recidivo dopo doppia PPH nel 2004 sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto</p>			
1	08/04/2015	7900	61 ANNI	2015002533	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto</p>			
1	08/04/2015	7614	63 ANNI	2015002534	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale. asportazione di polipo anorettale.</p>			
1	09/04/2015	10364	27 ANNI	2015002461	574.21 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,CON OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di colecistite acuta litiasica con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani.drenaggio. Cute in filo.</p>			
1	15/04/2015	7768	52 ANNI	2015002690	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>incisione ombelicale.in open si procede al pneumoperitoneo con l'introduzione del i trocar.sotto visione si introducono il II ed il III trocar fossa iliaca destra e sinistra sollevando la parete anteriore delle vagina si apre il peritoneo e si sutaura l'angolo a V di una rete con due branche lunghi 30cm fissando l'angola della rete con punti continue di stratafix.si tunnellizzano le branche sotto visione per uscire sora le spine iliache estere da una piccola incisione bilaterale.sutura del peritoneo controllando la riduzione del sitocele e la cortretta posizione della rete.si chiudono i fori dei trocar.sintesi dei tessuti Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto</p>			
1	15/04/2015	8334	47 ANNI	2015002691	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.</p>			
1	21/04/2015	9707	53 ANNI	2015002829	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso con 6 punti a paravaduti.resezione del retto STARR secondo lungo con doppia pph 03 anteriore e 01 posteriore.emostasi .sintesi dei tessuti .zaffo vasellinato in sede</p>			

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	22/04/2015	8339	77 ANNI	2015002852	550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA, RICORRENTE, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.00 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE, SAI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sn recidiva. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	30/04/2015	10717	68 ANNI	2015002898	998.31 - ROTTURA DI FERITA CHIRURGICA INTERNA	45.62 - ALTRA RESEZIONE PARZIALE DELL'INTESTINO TENUE
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

incisione sovraombelico pubico riaprendo la precedente incisione addominale . Apertura della cavità addominale con evidenza di raccolta enterica diffusa. Si preleva campione per esame colturale . A livello della anastomosi si dimostra la integrità della sutura ileo colica con deiscenza puntiforme della trancia ileale precedentemente affondata con echelon 60 ; il tratto prossimale del colon trasverso anastomizzato mostra aspetto ischemico . Una ansa ileale a circa 15 cm. dalla anastomosi presenta una area di necrosi parcellare con difetto di parete da cui fuoriesce materiale enterico . Si esegue isolamento e resezione del tratto ileo colico interessato con confezionamento di nuova anastomosi ileo colica meccanica con echelon 60 carica blu e sintesi della breccia residua con PDS 3/0 in doppio strato . Si esegue sutura di sopragitto sul moncone ileale anastomizzato . Toilette della cavità peritoneale con abbondante lavaggio con soluzione antisettica . Controllo della emostasi . Posizionamento di un drenaggio blake drain 24 f in corrispondenza della anastomosi ed in sede sottoepatica che fuoriesce nell'emiaddome dx e un drenaggio blake drain 24 f in sede pelvica e doccia parieto colica sinistra , che fuoriesce in emiaddome sinistro
Sintesi dei tessuti per piani . Cute in Nylon 3/0

1	05/05/2015	8379	71 ANNI	2015003089	618.04 - RETTOCELE	57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
---	------------	------	---------	------------	--------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso periombelicale posizionando un trocar da 12 mm. Posizionamento sotto visione di altri 2 trocar da 12 e 5 mm in fossa iliaca destra e sinistra rispettivamente. Apertura del peritoneo a livello della cupola vaginale fino a scoprire una superficie sufficiente all'ancoraggio della mesh di prolene. Introduzione attraverso il trocar da 12 mm di mesh in prolene a V adeguatamente sagomata. Ancoraggio della mesh alla cupola vaginale con Stratafix 2/0. Incisione a livello della spina iliaca superiore e tunnelizzazione delle branche della mesh e loro fissaggio sulla fascia muscolare bilateralmente. Chiusura del lembo del peritoneo con Stratafix a coprire completamente la mesh. Controllo dell'emostasi e chiusura dei fori da 12 mm per piani. Cute in filo.
In posizione litotomica si procede a STARR sec. Longo con doppia PPH, PPH 03 parete anteriore e PPH 01 parete posteriore. Controllo dell'emostasi. Zaffo vaselinato nel canale anale.

1	12/05/2015	11021	84 ANNI	2015003235	865.04 - TRAUMATISMO DELLA MILZA, SENZA MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ, MASSIVA DISTRUZIONE PARENCHIMALE	41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
---	------------	-------	---------	------------	---	----------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Incisione addominale mediana xifo sottombelicale. Alla apertura della cavità addominale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico quantizzato in circa 1800 ml di sangue fresco più numerosi coaguli diffusi a tutta la loggia sovramesocolica.
Lussazione manuale della milza che presenta una vasta lacerazione a tutto spessore con gemizio ematico in atto e presenza di nodulo biancastro di aspetto cerebroide in prossimità dell'ilo. Sezione ed emostasi dei legamenti spleno colico, spleno diaframmatico e spleno gastrico. Sezione dell'ilo splenico e legatura vascolare del peduncolo. Controllo degli altri visceri addominali senza rilevare altre fonti di sanguinamento. Assenza di carcinosi peritoneale grossolana nelle zone esplorabili. Lavaggio della cavità peritoneale e perfezionamento della emostasi della loggia splenica con falda emostatica fibrillare. Posizionamento di tubo di drenaggio Blake Drain 24 f. in loggia splenica. Sintesi della parete per piani. Cute in filo.

1	13/05/2015	8342	70 ANNI	2015003274	553.21 - LAPAROCLE POSTCHIRURGICO, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.61 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE CON PROTESI
---	------------	------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione cutanea sulla pre-esistente cicatrice sopra -sottombelicale. Reperto di grosso laparocle che si estende al disopra ombelico e sottombelico circa 12cm senza impegno di visceri o omento nel sacco erniario Preparazione del peritoneo e della tasca sottofasciale. Controllo dell'emostasi. Chiusura del peritoneo e posizionamento di mesh di prolene 12x6cm in sede properitoneale. Fissata con punti di Prolene 2/0 Chiusura del piano muscolo/fasciale con 4 semi-continue di PDS .chiusura della fascia addominale con il vicryl contorelease . sintesi dei tessuti a punti sataccati Sottocute e cute in filo.

1	13/05/2015	10038	55 ANNI	2015003277	574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON ALTRA COLECISTITE, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	---------------------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.

Incisione sopraombelicale. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome. Repertazione dei margini della linea alba e plastica della parete in PDS in continua. Chiusura a strati della parete. Cute in filo.

1	13/05/2015	8609	73 ANNI	2015003275	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.

1	19/05/2015	11171	57 ANNI	2015003380	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione ombelicale.in open si procede al pneumoperitoneo con l'introduzione del I trocar.sotto visione si introducono il II .III trocar sotto xifoideo e ipocondrio Dx.rteperito di colecistite acuta litiasica notevolmente distesa con parete ispessiti flogistici.videilaparocolecistectomia .emostasi.drenaggio sottoepatico.sintesi dei tessuti

1	20/05/2015	8338	9 ANNI	2015003434	605 - PREPUZIO E SUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	------	--------	------------	-------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Circoncisione per fimosi serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid 4-0.
Medicazione con Gentalyn crema

1	20/05/2015	8337	7 ANNI	2015003435	605 - PREPUZIO E SUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	------	--------	------------	-------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Circoncisione per fimosi serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema

1	20/05/2015	9223	65 ANNI	2015003437	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Reperto di numerose aderenze omento-parietali a livello ombelicale e sui fori dei trocar dell'intervento precedente. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco sinistro (per la lisi di aderenze) e destro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Sospensione dell'utero a parete con punto trasfisso su entrambe le tube. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con sospensore endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (6x11 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della vagina da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con Pro-Tack da un quarto trocar da 5mm inserito sovrapubico. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	27/05/2015	8614	76 ANNI	2015003599	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso periombelicale poszionando un trocar da 12 mm. Posizionamento sotto visione di altri 2 trocar da 12 e 5 mm in fossa iliaca destra e sinistra rispettivamente.reperto di cistocele Apertura del peritoneo a livello della cupola vaginale fino a scoprire una superficie sufficiente all'ancoraggio della mesh di prolene. Introduzione attraverso il trocar da 12 mm di mesh in prolene a V adeguatamente sagomata. Ancoraggio della mesh alla cupola vaginale con Stratafix 2/0. Incisione a livello della spina iliaca superiore e tunnelizzazione delle branche della mesh e loro fissaggio sulla fascia muscolare bilateralmente. Chiusura del lembo del peritoneo con Stratafix a coprire completamente la mesh. Controllo dell'emostasi e chiusura dei fori da 12 mm per piani. Cute in filo.

1	27/05/2015	8775	75 ANNI	2015003600	618.04 - RETTOCELE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--------------------	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.reperto di stenosi del canale anale dilatazione del canale anale
Posizionamento di CAD; si decide di procedere alla prolassectomia secondo Longo con PPH 03 .emostasi .sintesi dei tessuti.garza vaselinata in sede

1	27/05/2015	4152	65 ANNI	2015003607	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. emostasi., tampone riassorbibile nel canale anale.

1	03/06/2015	8776	52 ANNI	2015003745	618.3 - PROLASSO UTERO-VAGINALE,COMPLETO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento della paziente in posizione litotomica. Utilizzo di kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) con PPH 003 parete anteriore e PPH 001 parete posteriore previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo. Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura. Zaffo vaselinato nel retto

1	03/06/2015	9002	60 ANNI	2015003746	618.04 - RETTOCELE	48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI TESSUTI PERIRETTALI
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con due Endogia carica tissutale, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	10/06/2015	9187	38 ANNI	2015003913	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prollassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Ragade anale ore 6, si asporta.
Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	17/06/2015	9248	52 ANNI	2015004050	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	17/06/2015	9211	40 ANNI	2015004049	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.51 - RIPARAZIONE DI CISTOCELE
---	------------	------	---------	------------	---	----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione ombelicale si procede al pneumoperitoneo e all introduzione del primo trocar sotto visione, si introducono il II ed il III trocar del 10mm e del 5mm respittivamente.reperto di cistocele .sollevando la parete vaginale e vescicale si apre la riflessione peritoneale vescico vaginale: quindi viene fissata l'angolo della rete preventivamente tagliata e sagomata a v, alla parete vaginale; si estraggono le branche della rete a livello delle spine iliache superiore e si fissano alla fascia del muscolo obliquo esterno.peritonizzazione del pavimento pelvico.sintesi dei tessuti.

controllo del canale anale reperto di esite di fistolectomia con incontinenza fecale da lesione delle fibre sfinteriale per cui si soprasiede a qualunque intervento sul prollasso rettale

1	23/06/2015	9254	84 ANNI	2015004191	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario da scivolamento e sua riduzione in addome , emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	23/06/2015	9051	32 ANNI	2015004202	553.1 - ERNIA OMBELICALE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.49 - ALTRA ERNIORRAFIA OMBELICALE
---	------------	------	---------	------------	--	--------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.LUDOVICI):

Granulomi in sede sotto ombelicale sulla precedente cicatrice.
Incisione cutanea a losanga.
Asportazione granulomi.
Ricostruzione della parete addominale per piani.

1	23/06/2015	9290	75 ANNI	2015004198	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	---	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di voluminoso prolasso retto emorroidario di IV grado.si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 01 e 03 con il confezionamento di tre punti a paracadute anteriore e tre posteriore.resezione e anastomosi secopndo longo .emostasi .zaffo vasellinato in sede.

1	30/06/2015	10902	43 ANNI	2015004256	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidari di III ,IV grado circumferenziale sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril,ulteriore emostasi con il Floseal e fibrillare tampone riassorbibile nel canale anale.

1	16/07/2015	6266	77 ANNI	2015004697	553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.61 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE CON PROTESI
---	------------	------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione cutanea sulla pre-esistente cicatrice sopra -sottombelicale. Reperto di grosso laparocele sopra sottombelicale senza impegno di visceri o omento nel sacco erniario Preparazione del peritoneo e della tasca sottofasciale. Controllo dell'emostasi. Chiusura del peritoneo e posizionamento di mesh Proceed 30 cm x 30 cm in sede properitoneale. Fissata con punti di Prolene 2\0 Chiusura del piano muscolo\fasciale con controrelease. Resezione dei margini cutanei esuberanti. emostasi. Sottocute e cute in filo.

1	16/07/2015	9258	38 ANNI	2015004696	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
---	------------	------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso , sulla guida della cicatrice del precedente intervento chirurgico ; asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Controllo della emostasi . Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati . Sintesi del sottocute con Monocryl 2/0 in modo da accostare i margini cutanei che non vengono suturati . Medicazione compressiva

1	16/07/2015	9440	48 ANNI	2015004694	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	16/07/2015	9477	81 ANNI	2015004695	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	17/07/2015	9590	62 ANNI	2015004720	550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sn.recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	17/07/2015	9162	52 ANNI	2015004715	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	17/07/2015	9476	42 ANNI	2015004717	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	17/07/2015	9982	30 ANNI	2015004716	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	18/07/2015	9982	30 ANNI	2015004716	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di proctorragia con gemizio della sautura post prolassectomia secondo longo.operato il 17/07/15 .emostasi chirurgica con punti transfissi in vicry 2/0.controllo dell'emostasi .zaffo vasellinato con fibrillare .l

1	20/07/2015	10136	20 ANNI	2015004759	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	-------	---------	------------	------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi serrata. Emostasi.

Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema

1	20/07/2015	10412	50 ANNI	2015004756	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon60 mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	20/07/2015	10345	58 ANNI	2015004757	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso rettale emorroidario . asintomatico per ODS. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	22/07/2015	9708	72 ANNI	2015004803	618.5 - PROLASSO DELLA CUPOLA VAGINALE DOPO ISTERECTOMIA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	------	---------	------------	--	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso periombelicale posizionando un trocar da 12 mm. Posizionamento sotto visione di altri 2 trocar da 12 e 5 mm in fossa iliaca destra e sinistra rispettivamente. Tenaci aderenze della vagina alla vescica dall'intervento di isteroannessectomia. Difficoltosa liberazione del peritoneo pelvico ad esporre la cupola vaginale. Introduzione attraverso il trocar da 12 mm di mesh in prolene a V adeguatamente sagomata. Ancoraggio della mesh alla cupola vaginale con Stratafix 2/0. Incisione a livello della spina iliaca superiore e tunnellizzazione delle branche della mesh. Introduzione di sodio indigotindisolfonato dal catetere con piccola fuoriuscita in addome dalla parete posteriore della vescica. Si decide pertanto di eseguire controllo cistoscopico. Si apprezza, a livello del trigono/parete posteriore piccola area dalla quale in trasparenza si intravede la protesi. Si decide pertanto di rimuovere la stessa. Sutura della breccia vescicale con Stratafix 2-0. Chiusura del lembo del peritoneo. Controllo della tenuta vescicale senza fuoriuscita di liquido. Posizionamento di drenaggio tipo Blake 19Fr nel Douglas. Controllo dell'emostasi e chiusura dei fori da 12 mm per piani. Cute in filo. In posizione litotomica si procede ad esplorazione della regione ano-rettale. Reperto di prollasso rettale anteriore recidivo. Non è possibile posizionare il CAD della Trastar per pregresse aderenze del precedente intervento di STARR sec. Longo.

1	22/07/2015	10414	74 ANNI	2015004802	618.04 - RETTOCELE	48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI TESSUTI PERIRETTALI
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	22/07/2015	10067	84 ANNI	2015004801	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI TESSUTI PERIRETTALI
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di prollasso rettale recidivo dopo intervento di STARR sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	29/07/2015	9589	25 ANNI	2015004955	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Incisione inguinocrurale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione e sezione del legamento rotondo e reperto di ernia inguinale diretta. L'esplorazione della regione crurale destra risulta negativa per ernie. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura della fascia trasversalis a punti staccati di PDS 2/0, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh UltraPro. Chiusura a strati della parete. Cute in intradermica.

1	29/07/2015	9074	50 ANNI	2015004956	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Reperto di voluminoso rettocele di 6-7cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	29/07/2015	9213	33 ANNI	2015004959	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Reperto di discreto rettocele di 4-5 cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Escissione di marische cutanee. Zaffo vaselinato nel retto

1	29/07/2015	10445	33 ANNI	2015004957	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario circonfenziale di III grado. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall'apice delle emorroidi. Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.

1	29/07/2015	9913	63 ANNI	2015004958	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di III grado sanguinante asimmetrico sn>dx. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Presenza di nodulo emorroidario residuo ad ore 5 che viene asportato mediante Ligasure. Punti di emostasi in Vycril, tampone vaselinato nel canale anale.

1	30/07/2015	12449	65 ANNI	2015004966	153.3 - TUMORI MALIGNI DEL SIGMA	45.75 - EMICOLECTOMIA SINISTRA
---	------------	-------	---------	------------	----------------------------------	--------------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Induzione del pneumoperitoneo mediante ago di Verres in ipocondrio sinistro nel punto di Palmer posizionando un primo trocar da 12 mm, sotto guida ottica, in paraombelicale destra e sotto visione un secondo, da 5 mm, e terzo, da 12 mm, in ipocondrio dx e fossa iliaca dx. La neoplasia è del sigma prossimale, affiorante alla sierosa e le anse ileali risultano distese e poco mobili. Non lesioni secondarie peritoneali, presenza di alcune lesioni secondarie epatiche visibili in entrambe i lobi. Isolamento della vena mesenterica inferiore all'origine e apertura del retroperitoneo seguendo la fascia di Toldt. Isolamento all'origine dell'arteria mesenterica inferiore e della vena, sezione di entrambi i vasi con Echelon flex powered 60mm carica bianca. Lisi della doccia parieto-colica sx e liberazione del retto intraperitoneale. La presenza di anse distese non permette un'agevole liberazione della flessura splenica per cui si decide di procedere ad incisione ombelico-pubica sulla pregressa cicatrice chirurgica. Sezione del retto poco sopra la riflessione peritoneale pelvica su rastrello confezionando borsa di tabacco e posizionando testina di stapler 29. Anastomosi colo-rettale L-T e sezione del colon discendente con Echelon Flex 60 powered carica blu. Drenaggio anteriore all'anastomosi. Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.

1	30/07/2015	10470	65 ANNI	2015004988	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	31/07/2015	12637	18 ANNI	2015005019	540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta con peritonite diffusa, ascesso periappendicolare e distensione di tutte le anse ileali. La base dell'appendice risulta necrotica e perforata in cavità. Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone in doppio strato di Stratafix 3/0 e copertura del moncone affondato col grasso pericolico. Estrazione dell'appendice, posizionata in endobag, dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale e nella loggia sovraepatica è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Posizionamento di tubo di drenaggio tipo Blake n.19 in prossimità del moncone appendicolare. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo.

1	05/08/2015	10377	67 ANNI	2015005080	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione del funicolo e reperto di ernia inguinale diretta. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia trasversalis, emostasi. Apertura del funicolo ed esplorazione negativa per presenza di ernia inguinale obliqua esterna. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione del funicolo e reperto di ernia inguinale diretta. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia trasversalis, emostasi. Apertura del funicolo ed esplorazione negativa per presenza di ernia inguinale obliqua esterna. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	12/08/2015	2999	76 ANNI	2015005204	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm ed uno sovrapubico da 5 mm. Presenza di aderenze visceroparietali che vengono lisate per via smussa e tagliente fino ad ottenere uno spazio sufficiente per consentire di lavorare nella pelvi. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (6 x 11 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato con Stratafix 0 e dall'altro sul promontorio sacrale con Protac. Controllo dell'emostasi con posizionamento di fibrillare. Chiusura in continua del peritoneo pelvico con Stratafix 3/0. Presenza di laparocele periombelicale. Liberazione dalla aderenze per via smussa del peritoneoparietale e ricostruzione della parete a punti staccati di Vycril. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	21/08/2015	10781	74 ANNI	2015005348	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):						
Induzione dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per introdurre trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° trocar da 12 mm in paraetale dx e da 5 mm in pararettale sn. Apertura del peritoneo pelvico tra utero e vescica per esporre la cupola vaginale nuda mediante forbice. Fissaggio con stratafix 2\0 di rete di prolene sagomata a V alla cupola vaginale esposta mediante posizionamento di manipolatore vaginale. Incisione al di sopra della spina iliaca anterosuperiore bilateralmente e mediante pinza Overlot tunnelizzazione sottoperitoneale ed estrazione delle branche della rete i cui estremi vengono fissati in PDS alla fascia del muscolo obliquoi esterno. Chiusura del peritoneo vescico-uterino, controllo dell'emostasi e chiusura a a strati dei fori dei trocar. Cute in nylon Reperto di voluminoso rettocele ed intussuscezione retto-rettale sintomatica per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.						
1	25/08/2015	10453	68 ANNI	2015005394	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
reperito di rettocele in paziente operata per prolassectomia per emorroide altrove circa 10 anni fa.si procede alla STARR secondo lungo con doppia PPH posizionando tre punti anteriore e tre popsteriore eseguendo la resezione della parete anteriore con PPH 03 e 01 per la parete posteriore .emostasi con punti transfissi in vicryl.garza vasellinata in sede.						
1	25/08/2015	10627	37 ANNI	2015005395	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperito di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	25/08/2015	10627	37 ANNI	2015005395	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
reperito doi proctorragia in paz operato per prolassectomia secondo lungo ore 10 di oggi sanguinamento ad origine ore 12 da lieve soluzione di continuo con sanguinamento a nappo .emostasi con punti transfissi di vicryl .zaffo vasellinato in sede						
1	26/08/2015	10869	47 ANNI	2015005406	618.04 - RETTOCELE	48.69 - ALTRA RESEZIONE DEL RETTO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperito di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	26/08/2015	10963	81 ANNI	2015005407	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperito di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	02/09/2015	9984	36 ANNI	2015005520	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi serrata.frenulotomia per frenulo corto Emostasi. Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid Medicazione con Gentalyn crema						
1	02/09/2015	10557	68 ANNI	2015005521	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperito di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	02/09/2015	11398	46 ANNI	2015005530	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto</p>			
1	02/09/2015	10715	47 ANNI	2015005531	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto</p>			
1	02/09/2015	10557	68 ANNI	2015005521	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>reperto di proctorragia in paziente operata per TRANSTAR secondo lungo con gemizio ematico ale ore2.emostasi con punti transfissi in vicryl.controllo della sutura anastomotica nella norma.zaffo iodoformico</p>			
1	05/09/2015	13229	88 ANNI	2015005249	568.89 - ALTRI DISTURBI SPECIFICATI DEL	54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Incisione sopra-sottombelicale.per pneumoperitoneo discreto visualizzato alla TC saddome del 04/09/15 ,alla apertura del peritoneo fuoriuscita di abbondante quantità di area non odorante con lieve secrezione sieromeatica torbida che viene inviato all esame batteriologico .esplorazione dei visveri cavi .dal ansa del traiz al cieci e di tutto il tratto colico del duodeno e dello stomaco non segni di perforazione ne fuoriuscita di liquido ne di gas.si introducono circa 300ccdi blue di metelene.drenaggio sintesi dei tessuti</p>			
1	08/09/2015	13268	76 ANNI	2015005630	560.81 - ADERENZE INTESTINALI O PERITONEALI CON OCCLUSIONE (POSTOPERATORIO) (POSTINFETTIVO)	54.59 - ALTRE LISI DI ADESIONI PERITONEALI
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):			<p>Incisione inguinale obliqua sn. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale-scrotale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario, riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo. Incisione mediana sovra-ombelico pubica. All'apertura del peritoneo presenza di anse del piccolo intestino distese e liquido sieromeatico. Si individua briglia omento-mesenteriale che provoca una torsione sul suo asse dell'ultima ansa ileale con conseguente ischemia. Una volta liberata l'aderenza, dopo riscaldamento con acqua calda, si assiste a ripresa del colorito e della peristalsi dell'ultima ansa ileale. Esplorazione della cavità senza riscontro di ulteriori lesioni. Lavaggi abbondanti della cavità. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.</p>			
1	09/09/2015	12645	62 ANNI	2015005650	550.10 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,CON OSTRUZIONE,SENZA MENZIONE DI GANGRENA	53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esternascrotale voluminosa . Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in punti metallici</p>			
1	09/09/2015	11442	64 ANNI	2015005661	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.</p>			
1	09/09/2015	9053	43 ANNI	2015005656	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			<p>Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.</p>			

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	16/09/2015	3448	51 ANNI	2015005795	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. reperto di aderenze dell omento con la parete addominale si procede alla lisi aderenziale.Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
1	16/09/2015	3100	78 ANNI	2015005794	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incisione ombelicabile con l'introduzione del I trocar in open sotto visione si introducono il II ed il III trocar pararettale DX e SN esposizione del peritoneo vescico vaginale a livello della parete anteriore della vagina con buona esposizione della stessa dove viene suturata con filo stratafix in sutura continua l'angolo della rete preparata sul angolo di rete di 30cm x30cm con le branche che vengono esteriorizzate da due piccole incisione sulla spina iliaca superiore bilateralmente e tunnillizzazione per via extra peritoneale sotto controllo laparoscopico e sue fissazione sulla fascia del muscolo obliquo esternosecondo la tecnica POPS secondo Longo .emostasi Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla STARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore con 6 punti a paracaduti Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	16/09/2015	11073	43 ANNI	2015005797	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, escissione di ragade anale posteriore fistolizzata.emostasi.tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	23/09/2015	11273	51 ANNI	2015005954	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	23/09/2015	10901	51 ANNI	2015005949	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto escissione di marisca cutanea						
1	23/09/2015	11072	60 ANNI	2015005939	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidariodi IV grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	23/09/2015	10931	33 ANNI	2015005942	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	24/09/2015	11478	35 ANNI	2015005976	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI TESSUTI PERIRETTALI

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS. Utilizzo di due kit PPH (03 anteriore e 01 posteriore) per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e tre emiborse posteriori in PDS 2/0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo. Emostasi in Vicryl 3/0 sulla rima di sutura. Zaffo vaselinato nel retto.

1	30/09/2015	11477	44 ANNI	2015006070	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di cistocele.incisione ombelicale,in open si procede al pneumoperitoneo con l'introduzione del II ed il III trocar paraetale dx del 11mm e di 5mm pararettale sn aperto la riflessione del peritoneo vescico vaginale si posiziona l'angolo della rete di 30cm x30cm con due branche pretagliata e sagomata estrazione delle branche da due piccole incisione sopra la spina iliaca bilateralmente per via extra peritoneale .chiusura del peritoneo controllo del posizionamento della ret chiusura dei fori dei trocar.sintesi dei tessuti

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	30/09/2015	11045	69 ANNI	2015006076	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	30/09/2015	11702	51 ANNI	2015006079	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	03/10/2015	13794	78 ANNI	2015006133	575.5 - FISTOLA DELLA COLECISTI	51.22 - COLECISTECTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	---------------------------------	-------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione xifo ombelico pubica.reperto di occlusione intestinale da ileo biliare per la presenza di calcolo colesterinico voluminoso con ectasia a monte. ileotomia con estrazione del calcolo .ileorrafia.

.esplorazione dell'ipocondriuo destro .presenza di nemeorsi e tenace aderenze tra stomaco e duodeno e coleciste per la presenza di fistola colecisto duodenale.dissezione accurata con individuazione della fistola e sutura a doppio strato della parete duodenale.colecistectomia anterograda difficoltosa. emostasi.controllo dei visceri addominale .drenaggio dx sotto epatico dernaggio sn nello scavo pelvico.sintesi dei tessuti parete a strati con cute in filo

1	07/10/2015	11647	37 ANNI	2015006222	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	69.22 - ALTRA SOSPENSIONE UTERINA
---	------------	-------	---------	------------	---	-----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di rettocele di circa 3cm.si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03parete anteriore e 03 parete posteriore.esposizione del prolasso con punti a partacadute annt e tr posteriore.Starr .emostasi con punti di sutura in vicryl.zaffo vasellinato in sede

1	07/10/2015	11507	70 ANNI	2015006217	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	07/10/2015	13725	34 ANNI	2015006225	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.con ragade anale
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03 ant e 01 posteriore.emostasi .escissione di ragade anale .garza vasellinata in sede

1	09/10/2015	11095	9 ANNI	2015006263	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	-------	--------	------------	------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circonscisione per fimosi serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema

1	09/10/2015	11674	50 ANNI	2015006266	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	09/10/2015	13429	33 ANNI	2015006267	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

repero di fistola perianale transfinterica alle ore 3 con filo di seta a dernare da alcune mese.individuazione del tramite fistoloso con l'orifizio interno ed esterno.fistolectomia parziale con setone elastico a drenare.zaffo iodoformico in sede.

1	09/10/2015	11834	69 ANNI	2015006268	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	13/10/2015	5786	79 ANNI	2015006335	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di prolasso di cupola con enterocele.esterno di IV grado.
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. reperto di aderenze pelviche con difficoltà di esposizione del promontorio sacrale per cui si converte in open con incisione ombelico pubica.
esposizione della vagina e apertura dello scavo retto vaginale mobilizzando il retto verso sn liberazione con buona esposizione del promontorio sacrale.
fissaggio di rete di prolene con punti continue in prolene .sulla parete posteriore della vagina.fissaggio della rete sul promontorio sacrale con la protac.
peritonizzazione emostasi controllo del posizionamento corretto della cupola vaginale.sintesi dei tessuti sutura della parete cute in filo

1	14/10/2015	11125	63 ANNI	2015006357	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di rettocele con prolasso rettale di circa 5cm.si procede alla STARR secondo longo con TRANSTAR .esposizione del prolasso con 6 punti .
scomposizione del prolasso sezione con la TRANSTAR 6 caricatore ,emostasi .sintesi dei tessuti .zaffo vasellinato in sede

1	14/10/2015	12050	44 ANNI	2015006359	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	19/10/2015	14136	18 ANNI	2015006458	540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta perforata con peritonite diffusa e raccolta purulenta si aspira il liquido peritoneale e si invia all'esame batteriologico e colturale
Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo

1	21/10/2015	12400	52 ANNI	2015006498	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS si procede alla STARR secondo longo con TRANSTAR esponendo il prolasso con 6 punti a paracadute tre anteriore e tre posteriore scomposizione del prolasso con echilon 45 utilizzando la TRANSTAR con 6 cartucce.emostasizaffo vasellinato in sede

1	21/10/2015	11883	61 ANNI	2015006514	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso si procede alla STARR secondo longo con doppia PPH 03 anteriore e 03 posteriore. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	21/10/2015	11913	60 ANNI	2015006510	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	28/10/2015	11735	47 ANNI	2015006655	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico di circa 4cm si procede alla STARR secondo Longo con la TRANSTAR.repertando il prolasso con 6 punti in PDS e sua scomposizione in ant o posteriore con echilon 45.si procede alla resezione con la TRANSTAR 5 ricariche.emostasi .sintesi dei tessuti. zaffo vasellinato in sede

1	28/10/2015	11352	38 ANNI	2015006658	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	04/11/2015	13279	60 ANNI	2015006670	618.04 - RETTOCELE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di IV grado con componente esterna trombizzata. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	04/11/2015	12045	40 ANNI	2015006795	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	04/11/2015	12399	65 ANNI	2015006792	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di rettocele voluminoso con prolasso rettale ostrottivo con melanosia coli.si procede alla esposizione del prolasso con tre punti a partacadute ant e tre posteriore.scomposizione del prolasso con echilin 45.resezione secondo lungo con la TRANSTAR con 5+1 cartucce.emostasi garza vasellinata in sede.

1	04/11/2015	11349	80 ANNI	2015006797	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.con prolasso esterno
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso si pèrocede alla STARR secondo lungo con doppia PPH 03 ant. e 01 posteriore.emostasi.garza vasellinata in sede

1	11/11/2015	12398	60 ANNI	2015006966	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	11/11/2015	12890	61 ANNI	2015006969	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	11/11/2015	12681	56 ANNI	2015006967	565.1 - FISTOLA ANALE	49.11 - FISTULOTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di fistola perianale alle ore 2 si individuano gli orifizi esterno ed interno.si procede alla fistolectomia parziale con posizionamentop di setone elastico.zaffo iodoformico in sede.emostasi

1	11/11/2015	12248	77 ANNI	2015006950	574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON ALTRA COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. colecistite acuta litiasica idropica estremamente distesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecche per piani. Cute in filo.

1	07/11/2015	14470	63 ANNI	2015006826	566 - ASCESSO ANALE E RETTALE	49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
---	------------	-------	---------	------------	-------------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di ascesso perianale sn. incisione e drenaggio lavaggio con h2o2 e amukina. zaffo iodoformico.

1	18/11/2015	12962	66 ANNI	2015007116	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di rettocele con ods .si procede alla TRANSTAR SECONDO LONGO CON LA SCOMPOSIZIONE DEL PROLASSO TRE PUNTI ANT A PARACADUTE E TRE POSTERIORE TRANSTAR CON 6 CARTUCCI .EMOSTASI .ZAFFO VASELLINATO INSEDE.

1	18/11/2015	12713	40 ANNI	2015007119	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	18/11/2015	12715	40 ANNI	2015007112	078.11 - CONDILOMA ACUMINATO	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

PRESENZA DI N. 3 CONDILOMI ACUMINATI PERIANALI H 12.. SI ASPORTANO CON L'AUSILIO DELL'ELETTROBISTRUTI. MEDICAZIONE A PIATTO

1	25/11/2015	13263	42 ANNI	2015007260	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale in paziente obesa. posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. colecistite cronica litiasica con pareti ispessite isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecche per piani. Cute in filo.

1	25/11/2015	12963	42 ANNI	2015007256	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	02/12/2015	13310	31 ANNI	2015007473	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	02/12/2015	12048	44 ANNI	2015007475	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	09/12/2015	13599	48 ANNI	2015007584	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	09/12/2015	12356	48 ANNI	2015007583	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	09/12/2015	12889	37 ANNI	2015007586	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Reperto di fistola perianale transinterica anteriore alle ore 11 con ill'orifizio esterno verso lo scroto.si procede alla individuazione degli orifizi interno ed esterno con il blue di metelene.dissezione del tramite fistoloso .con la fistolectomia parziale posizionando il setone elastico a drenare.emosytasi .zaffo iodoformico in sedi						
1	16/12/2015	7377	49 ANNI	2015007761	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	16/12/2015	13130	35 ANNI	2015007765	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	17/12/2015	15331	62 ANNI	2015007671	574.80 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI E DEL DOTTO BILIARE,CON COLECISTITE ACUTA E CRONICA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.22 - COLECISTECTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): incisione ombelicale con l'introduzione in open del I trocar .repereto di tenace aderenze per cui si procede alla iIncisione sottocostale destra. All'apertura del peritoneo si apprezza omento flogistico che copre la colecisti con numerosi e tenace aderenze dai pregressi interventi chirurgici. Sollevato l'omento, la colecisti si presenta a parete ispessite flogistiche edematose,, con aree di necrosi franca.lisi aderenziale, Colecistectomia anterograda fino ad isolare dotto ed arteria cistica che vengono isolati e sezionati con clips. Controllo dell'emostasi.fibrillare emostatico nel letto epatico Lavaggi multipli della cavità addominale. Posizionamento di drenaggio tipo Blake 24 Fr nel letto colecistico. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.						
1	13/01/2016	12892	7 ANNI	2016000219	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi serrata. Emostasi. Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid Medicazione con Gentalyn crema						
1	13/01/2016	7003	34 ANNI	2016000227	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	13/01/2016	13295	36 ANNI	2016000229	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	13/01/2016	13566	61 ANNI	2016000228	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	13/01/2016	12634	54 ANNI	2016000226	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	16/01/2016	15852	16 ANNI	2016000324	540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa del fondo.
Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Chiusura della breccia ombelicale in PDS.drenaggio Cute in filo

1	20/01/2016	15507	58 ANNI	2016000434	565.0 - RAGADE ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di ragade anale posteriore cronica fistolizzata.si procede alla escissione della ragade anale con fistolectomia .emostasi .garza vasellinata in sede

1	20/01/2016	13826	46 ANNI	2016000426	553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.51 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione cutanea in corrispondenza della tumefazione localizzata al di sopra pfnasteel da pregresso cesareo .asportazione in blocco della neoformazione adesa alla fascia della parete addominale si invia all'esame istologico per sospetta endometriosi .plastica della parete con punti staccati in pds.sintesi dei tessuti

1	20/01/2016	13854	44 ANNI	2016000431	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale con gemizio ematico ad ore 6. Elettrocoagulazione del fondo della ragade.

1	20/01/2016	13857	65 ANNI	2016000427	569.1 - PROLASSO RETTALE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso rettale e emorroidario,con perineo discendente e ipotono sfinteriale . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	26/01/2016	14635	55 ANNI	2016000585	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4.5cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	27/01/2016	13940	42 ANNI	2016000614	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	27/01/2016	13790	55 ANNI	2016000610	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica FCSSME34 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	30/01/2016	14470	63 ANNI	2016000588	566 - ASCESSO ANALE E RETTALE	49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
---	------------	-------	---------	------------	-------------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

repewrto di ascesso perianale alle ore 7 fistolezzato con tramite fistoloso transfinterico. incisione e drenaggio della cavita ascessuale con H2O2 e Amukina. fistolotomia parziale con posizionamento di setone elastico a drenare con garza iodoformica nella cavita ascessuale. emostasi.

1	01/02/2016	16146	84 ANNI	2016000710	866.03 - TRAUMATISMO DEL RENE, SENZA MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ, COMPLETA DISTRUZIONE DEL PARENCHIMA DEL RENE	55.51 - NEFROURETERECTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	---	----------------------------

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

incisione mediana xifo pubica . Reperto di grossolana tumefgazione retroperitoneale con evidente infarcimento emorragico in corrispondenza della loggia renale sinistra . Apertura della doccia colica sinistra con bisturi a radiofrequenza ed esposizione della capsula di Gerota totalmente infarcita da stravasamento emorragico. Isolamento dell'uretere e sua sezione . Mobilizzazione in blocco del rene e della sua capsula fino ad evidenziare i vasi che vengono sezionati tra lacci . Asportazione del rene in blocco con la capsula . Controllo della emostasi perfezionata con falda di Tachosil ed emostatico fibrillare . . Esplorazione della cisti renale destra nota e sua marsupializzazione . Controllo della cavita' addominale che appare esente da stravasi emorragici . La milza appare indenne . Si posiziona drenaggio tipo Balck Drain 24 in loggia renale . Chiusura della parete per piani . Cute in filo

1	02/02/2016	14519	77 ANNI	2016000748	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per introdurre 1° trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° trocar da 12 e 5 mm in FID e FIS. Tentativo di esposizione della pelvi, del promontorio sacrale e della parete vaginale posteriore che risulta impossibile per la presenza di abbondante adipe ed estrema profondità della pelvi stessa. Conversione mediante incisione ombelico-pubica, apertura della cavità addominale, lateralizzazione e liberazione del retto lungo la fascia mesoretale per esporre il promontorio ed il sacro sino al piano degli elevatori; spertoneizzazione della parete vaginale, che viene fissata alla parete vaginale posteriore in doppio stato 2\0 Stratafix. Previo controllo transvaginale della corretta pessa si esegue fissaggio della porzione prossimale della rete al promontorio sacrale mediante doppia fila di ProTack. Controllo dell'emostasi. Chiusura a strati della parete addominale, sottocute in monocryl, cute in nylon

1	03/02/2016	14285	54 ANNI	2016000762	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	03/02/2016	14516	71 ANNI	2016000769	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	03/02/2016	14018	49 ANNI	2016000768	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale con gemizio ematico ad ore 6. con ipertono sfinteriale Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizionamento di zaffo endoretale .

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	03/02/2016	14289	33 ANNI	2016000771	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	03/02/2016	13882	23 ANNI	2016000766	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	04/02/2016	16248	84 ANNI	2016000540	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):						
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti enormemente distesa empiematosa con pareti ispessite, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia estremamente indaginosa per la flogosi del letto colecistico. Controllo dell'emostasi mediante applicazione di falda di fibrillare. Drenaggio sottoepatico tipo Blake n.19. Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.						
1	06/02/2016	14516	71 ANNI	2016000769	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
:Reperto di live proctorragia da gemizio in corrispondenza della rima di sutura in paziente operata pèr STARR secondo Longo.emostasi con puntitransfissi di vicryl. e falda emostaica fibrillare .zaffi vasellinatpo in sede						
1	09/02/2016	16113	79 ANNI	2016000669	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di colecistite cronica litiasica distesa con tenace aderenzei, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi.drenaggio sotto epatico Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.						
1	10/02/2016	14263	29 ANNI	2016000933	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
reperto di voluminoso rettocele con prolasso rettale sintomatico per ods,si procede alla starr con TRANSTAR secondo Longo esteriorizzando il prolasso rettale con 6 punti a paracadute .scomposizione del prolasso in anteriore e posterioe con echilon 45 e transtar con 6 cariche. emostasi .sintesi dei tessuti garza vasellinat in sede						
1	12/02/2016	13166	58 ANNI	2016000979	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (M.MALERBA):						
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 001 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.						

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	24/02/2016	15890	83 ANNI	2016001221	173.4 - ALTRI TUMORI MALIGNI DEL CUOIO CAPELLUTO E COLLO	86.3 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO CUTANEO E SOTTOCUTANEO
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):			Basalioma sanguinante del cuoio capelluto di circa 4x3 cm. Adeguata incisione a losanga. Emostasi. Cute in Ethilon 0. Un'ulteriore piccola lesione sanguinante dell'elice dell'orecchio destro. Si asporta. Cute con Ethilon 3-0.			
1	24/02/2016	14222	80 ANNI	2016001248	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	54.21 - LAPAROSCOPIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto a tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.			
1	24/02/2016	14407	43 ANNI	2016001254	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto			
1	24/02/2016	14434	51 ANNI	2016001250	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.			
1	24/02/2016	15216	58 ANNI	2016001252	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.			
1	02/03/2016	14524	59 ANNI	2016001439	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si repert ernia inguinale obliqua esterna scrotale. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plicatura della trasversalis. Plastica erniaria mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon			
1	02/03/2016	6311	56 ANNI	2016001443	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. reperto di cistocele recidiva da distacco della rete a V dalla parete vaginale anteriore per cui si procede alla Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, con filo stratafix in prolene fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.			
1	03/03/2016	16592	62 ANNI	2016001161	998.32 - ROTTURA DI FERITA CHIRURGICA ESTERNA	54.61 - RISUTURA DI DIASTASI POSTOPERATORIA DELLA PARETE ADDOMINALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Re-apertura della ferita mediana addominale con reperto di deiscenza fasciale completa e anse in sede sottocutanea. Modesta secrezione sierosa in cavità addominale. Accurata toilette della stessa con fisiologica calda. Posizionamento di quattro punti di scarico lateralmente ai muscoli retti dell'addome in PDS su batuffoli di garza a protezione cutanea. Chiusura del peritoneo in vicryl, sutura fasciale in Vicryl a punti staccati, sottocute in monocryl, cute in nylon.			

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	09/03/2016	14560	57 ANNI	2016001617	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
reperwto di rettocele sintomatico per ODS si procede alla STARR secondo Longo con TRANSTAR .scomponendo il prolasso in emicirconferenza anteriore e posteriore con 6 punti a paracadute con l'utilizzo do echilon e 4 caricatore di transtar.emostasi gar4za vasellinata in sede						
1	09/03/2016	14523	64 ANNI	2016001622	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di discreto rettocele di 6cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	09/03/2016	13677	36 ANNI	2016001620	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	10/03/2016	17033	49 ANNI	2016001638	566 - ASCESSO ANALE E RETTALE	49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di ascesso pereianale Sn ore 3.incisione e drenaggio .zaffo iodoformico in sede.						
1	16/03/2016	13793	45 ANNI	2016001797	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	57.89 - ALTRA CHIRURGIA PLASTICA VESCICALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso periombelicale posizionando un trocar da 12 mm. Posizionamento sotto visione di altri 2 trocar da 12 e 5 mm in fossa iliaca destra e sinistra rispettivamente. Apertura del peritoneo a livello della cupola vaginale fino a scoprire una superficie sufficiente all'ancoraggio della mesh di prolene. Introduzione attraverso il trocar da 12 mm di mesh in prolene a V adeguatamente sagomata. Ancoraggio della mesh alla cupola vaginale con Stratafix 2/0. Incisione a livello della spina iliaca superiore e tunnelizzazione delle branche della mesh e loro fissaggio sulla fascia muscolare bilateralmente. Chiusura del lembo del peritoneo con Stratafix a coprire completamente la mesh. Controllo dell'emostasi e chiusura dei fori da 12 mm per piani. Cute in filo.						
1	16/03/2016	15509	56 ANNI	2016001792	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con Echelon 60mm carica verde alle ore 3 e 9, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	16/03/2016	14186	44 ANNI	2016001791	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):						
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura.Asportazione di maresche sul margine anale con elettrobisturi . Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.						
1	30/03/2016	14287	58 ANNI	2016002092	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperit ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon

1	30/03/2016	14521	62 ANNI	2016002096	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. paziente operata per isterectomia Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Repertop di stenosi anale serrata si procede alla divulgione del canale anale e si ritiene di non procedere al trattamento del rettocele per la stenosi anale presente.

1	30/03/2016	14605	54 ANNI	2016002095	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due endogea 45 carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	30/03/2016	16081	60 ANNI	2016002097	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di fistola perianale transfinterica ore 5 si individuano gli orifizi interno ed esterno e si procede alla fistolectomia parziale con il setone elastico. zaffo idofornico in sede

1	06/04/2016	14996	50 ANNI	2016002273	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con divaricatore endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice con stratafix in prolene . Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo. reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS.sospensione esteriozzando il prolasso con 6 punti a paracadute.scomposizione del prolasso in anteriore e posteriore con ENDOGEA.si procede alla STRARR secondo Longo con TRANSTAR 5+1 cartucce.emostasi .zaffo vaselinato in sede

1	06/04/2016	12398	60 ANNI	2016002277	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	06/04/2016	15430	72 ANNI	2016002278	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 5cm con mega retto con voluminoso fecaloma solido del retto all interno.sintomatico per ODS.asportazione del fecaloma . Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60 mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	06/04/2016	17019	35 ANNI	2016002280	565.1 - FISTOLA ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Divulsione anale digitale. reperto di fistola perianale posteriore transfinterica alle ore 6. si individua l'orifizio interno ed esterno si pècede alla fistolectomia parziale con il setone elastico a drenare.emostasi

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	07/04/2016	17576	71 ANNI	2016002251	174.3 - TUMORI MALIGNI DEL QUADRANTE INFERO-INTERNO DELLA MAMMELLA DELLA DONNA	85.22 - QUADRANTECTOMIA DELLA MAMMELLA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Incisione a losanga in corrispondenza del quadrante inferiore interno della mammella destra per voluminosa massa necrotico emorragica che coinvolge tutto il quadrante.escissione in blocco di tutta la massa fino alla fascia del muscolo pettorale esterno.emostasi .drenaggio sintesi dei tessuti			
1	13/04/2016	14927	49 ANNI	2016002432	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinale da scivolamento in paz operato per svuotamento con linfadenectomia inguinale per melanoma con tenace aderenze cicatriziale ed interruzione del legamento inguinale sn . isolamento del sacco erniario e sua riduzione in addome con plug di prolene.recostituzione del legamento inguinale e plastica della parete con rete di prolene.emostasi sintesi tessuti			
1	13/04/2016	15111	39 ANNI	2016002428	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0.asportazione di polipo rettale Zaffo vaselinato nel retto			
1	13/04/2016	15022	66 ANNI	2016002423	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	48.35 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL RETTO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			reperto di polipo del retto asportazione del polipo rettale emostasi con punto transfisso in vicryl.			
1	15/04/2016	8079	69 ANNI	2016002477	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinoscrotale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo			
1	15/04/2016	14130	63 ANNI	2016002478	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (P.TAGLIAFERRI):			Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta ernia inguinoscrotale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. . Plastica erniaria mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon			
1	15/04/2016	14877	70 ANNI	2016002480	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):			Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornicecon stratifax in prolene . Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.			
1	20/04/2016	15106	67 ANNI	2016002570	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	20/04/2016	15112	80 ANNI	2016002581	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	20/04/2016	15743	61 ANNI	2016002573	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	04/05/2016	14607	57 ANNI	2016002804	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di voluminoso rettocele. si procede aòlla STARR secondo Longo con TRANSTAR con la scomposizione del prolasso rettale estreiorizzato con 6 punti a paracaduti in anteriore e posteriore .transtar con 7 cartuicci,emostasi .zaffo vasellinato in sede

1	04/05/2016	15594	84 ANNI	2016002807	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	04/05/2016	15027	49 ANNI	2016002805	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	11/05/2016	15223	63 ANNI	2016002997	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di voluminoso rettocele con prolasso rettale.sospensione del prolasso con 6 punti a paracadute.e scomposizione del prolasso con echilon 45 .si procede alla SYTARR secondo Longo con TRANSTAR con 5 caritucce emostasi .sintesi dei tessuti.garza vasellinata in sede

1	11/05/2016	15024	43 ANNI	2016003010	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	11/05/2016	15741	55 ANNI	2016003004	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

reperto di polipi delò retto.asportazione dei polipi del ano retto

1	11/05/2016	15171	58 ANNI	2016003008	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	11/05/2016	15590	40 ANNI	2016003005	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III,grado asimmetriche grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	13/05/2016	15171	58 ANNI	2016003008	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di proctorragia in paziente operato di prolassctomia secondo longo .con gemizio ematico.emostasi con punti transfissi in vicryl.zaffo vasellinato in sede

1	17/05/2016	14512	32 ANNI	2016003125	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	18/05/2016	16584	36 ANNI	2016003148	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n°5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	18/05/2016	15110	70 ANNI	2016003155	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di prolasso rettale recidivo in paz operata 10 anni fa.con esiti cicatriziale.si mprocede alla prolassectomia secondo Longo con PPH 01.emostasi . sintesi deio tessuti.garza vasellinata in sede

1	18/05/2016	15107	46 ANNI	2016003153	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	21/05/2016	15590	40 ANNI	2016003232	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di proctorragia in paziente operato 10gg fa di prolassectomia secondo longo. con gemizio ematico.si procede alla emostasi con punti transfissi in vicryl.zaffo vasellinato in sede

1	25/05/2016	15279	80 ANNI	2016003292	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	25/05/2016	15663	61 ANNI	2016003297	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con divaricatore endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di prollasso rettale con rettocele sintomatico per ODS, si procede alla sospensione ed al consolidamento del prollasso con sei punti a paracadute, scomposizione dello stesso con Echelon Flex 45 mm carica tissutale e resezione con Transtar secondo Longo utilizzando n° 5 +1 ricariche. Controllo dell'emostasi e tampone vaselinato in anoretto

1	25/05/2016	15342	44 ANNI	2016003296	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di prollasso rettale con rettocele sintomatico per ODS si procede alla sospensione ed al consolidamento del prollasso con 6 punti a paracaduti scomposizione dello stesso con echilonflex 45 mm resezione con transtar secondo longo 1+4 cariche .emostasi .tampone vasellinatpo nell ano retto

1	25/05/2016	15590	40 ANNI	2016003316	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di gemizio ematico con flogosi tessutale dalle ore 4 alle ore10 .infiltrazione di adrenalina 1f portata a 10ml di fisiologica emostasi con punti transfissi in vicryl.emostasi con floseal .controllo della anastomosi con accurata emostas.tampone rettale vasellinato in sede.

1	28/05/2016	18537	56 ANNI	2016003362	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	-------	---------	------------	------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circonscisione per fimosi serrata. Emostasi.frenulotomia per frenulo corto
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema

1	01/06/2016	17301	60 ANNI	2016003437	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario di III.IV grado con episodi di pèroctorragia. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycryl, tampone riassorbibile nel canale anale.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	31/05/2016	11245	75 ANNI	2016003412	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

paz con diatesi emorragica in trattamento pregresso con il coumadin par la patologia cardio vascolare nota. Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti modestamente distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria cistica. emostasi cin il fibrillare Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.

1	08/06/2016	16134	53 ANNI	2016003557	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di rettocele con prollasso rettale sintomatico per ODS. consolidamento con sospensione del prollasso con 6 punti a paracaduti TRANSTAR secondo lungo con ccs 30 5 cariche dopo aver scomposto il prollasso in anteriore e posteriore con echilon45. emostasi -zaffo vasellinato in sede zaffo di garza con petadine in vagina

1	08/06/2016	15595	70 ANNI	2016003555	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario asimmetrico . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	08/06/2016	15576	58 ANNI	2016003556	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	15/06/2016	15666	64 ANNI	2016003710	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente con estrema difficoltà dovuto alla pregressa isterectomia con tagli cesaree con cicatrice aderenziale sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

controllo cistoscopico

CISTOSCOPIA: introduzione agevole dello strumento. presenza di lieve ematuria. per quanto valutabile la mucosa vescicale appare indenne tranne che per una piccola soluzione di continuo sulla parete postero-laterale sx anteriormente all'impronta della rete che tuttavia non è visualizzabile. posizionato catetere vescicale 3 vie 20 ch da mantenere in sede per almeno 10 gg.

1	15/06/2016	4658	61 ANNI	2016003707	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vycril 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	22/06/2016	4579	37 ANNI	2016003859	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con Doppia PPH STARR secondo lungo. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	22/06/2016	15428	65 ANNI	2016003858	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	22/06/2016	16086	43 ANNI	2016003860	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	29/06/2016	3969	89 ANNI	2016003990	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione del funicolo e reperto di ernia inguinale diretta.

Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia trasversalis, emostasi. Apertura del funicolo ed esplorazione negativa per presenza di ernia inguinale obliqua esterna. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in ethilon.

1	29/06/2016	16357	65 ANNI	2016003995	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	30/06/2016	16086	43 ANNI	2016004014	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di proctorragia in paz operato per prolassectomia secondo lungo 7 gg fa reperto di gemizio ematico alle ore 4 e 7 emostasi con punti transfissi in vicryl e successiva applicazione di floseal sulla rima di sutura tampone di fibrillare nel canale anorettale.

1	29/06/2016	16438	57 ANNI	2016003994	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla STRARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore .emostasi con punti transfissi in vicryl .zaffo vaselinato in sede

1	29/06/2016	16923	69 ANNI	2016003997	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di III grado sec Millegrin sintomatico per ODS.con deformazione flogistica del canale anorettale dal pregresso intervento

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	20/07/2016	12312	67 ANNI	2016004454	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore 4, introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore 4 di orificio interno a livello del canale anale di

fistola rettilinea transfinerica. Fistulectomia parziale fino al piano muscolare. Emostasi. Posizionamento di seton loose. Reperto di ragade cronica ad ore 6. Elettrocatterizzazione della stessa. Zaffo iodofornico della cavità residua.

1	20/07/2016	16495	73 ANNI	2016004458	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	20/07/2016	12920	56 ANNI	2016004457	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Asportazione di marische cutanee. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	20/07/2016	16384	54 ANNI	2016004460	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	25/07/2016	19585	65 ANNI	2016004495	153.6 - TUMORI MALIGNI DEL COLON ASCENDENTE	45.73 - EMICOLECTOMIA DESTRA
---	------------	-------	---------	------------	--	------------------------------

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Laparotomia mediana sovraombelico-pubica.

Aperto il peritoneo con reperto di abbondante raccolta liquida sierosa di cui si aspira un campione per esame citologico . Si apprezza inoltre distensione delle anse ileali a monte .

Si conferma palpatoriamente la presenza del polipo del cieco; negativa per lesioni secondarie la palpazione del fegato e la esplorazione dei visceri addominali.

Scollamento del colon dx lungo la doccia parietale fin oltre la flessura dx, sezione del legamento gastro-colico nella sua porzione dx.

Isolamento e sezione all'origine dei vasi ileo-colici, dx e ramo dx dei medi.

Sezione dell'ultima ansa ileale e del trasverso prossimale con echelon 60 carica blu .

Anastomosi tra ileo e trasverso latero-laterale isoperistaltica, manuale in doppio strato.

Controllo dell'emostasi.

Posizionamento di drenaggio in doccia dx e in prossimità dell'anastomosi.

Chiusura della parete per piani. Cute in filo.

1	27/07/2016	18177	61 ANNI	2016004604	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Asportazione di gozzo emorroidario esterno trombizzato ad ore 7. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	27/07/2016	19591	59 ANNI	2016004546	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx.reperto di colecistite acuta litiasica , isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Estrazione della colecisti in un bag. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecche per piani. drenaggio. Cute in filo.

1	28/07/2016	2999	77 ANNI	2016004624	553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.61 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE CON PROTESI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione cutanea sulla pre-esistente cicatrice sopra-sottombelicale. Reperto di grosso laparoccele .senza impegno di visceri o omento nel sacco erniario Preparazione del peritoneo e della tasca sottofasciale. Controllo dell'emostasi. Chiusura del peritoneo e posizionamento di mesh di prolene in sede properitoneale. Fissata con punti di Prolene 2/0 Chiusura del piano muscolo/fasciale . Resezione dei margini cutanei esuberanti. e cute in filo.

1	28/07/2016	16717	61 ANNI	2016004630	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	28/07/2016	17012	45 ANNI	2016004627	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	28/07/2016	16085	30 ANNI	2016004628	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore6 , introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore di orificio interno a livello del canale anale di fistola rettilinea su ragade anale posteriore
Fistulectomia. Emostasi.

1	03/08/2016	16494	62 ANNI	2016004724	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di voluminoso rettocele ostruttivo con prolasso rettale.si procede al consolidamento con esterorizzazione del prolasso con 8 punti a paracadute con la scomposizione del prolasso con echilon 45.si procede alla STARRa con Transtar secondo longo.conb 6+1 caricatore-emostasio con zaffo vasellinato in sede
Si segnala la presenza di laparocoele in sede della pregressa appendicectomia con difetto di parete 2cm x3cm.si preferisce di soprassedere data la stretta di vicinanza del tragitto percorso dalla mesh correttiva del prolasso pelvico con la POPS

1	03/08/2016	17299	59 ANNI	2016004728	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	03/08/2016	17444	42 ANNI	2016004729	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	10/08/2016	6529	63 ANNI	2016004828	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	10/08/2016	18785	52 ANNI	2016004829	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperito di rettocele residuo in paziente operata per starr secondo longo nel 2013.con asimmetria del rettocele si procede alla starr secondo longo con doppia pph 01 consolidando il prolasso estreiorizzando lostesso con tre punti a paracadute anteriore e tre posteriore .emosatasi con punti transfissi in vicryl.zaffo vasellinato in sede.asportazione di marische cutanee

1	10/08/2016	19531	54 ANNI	2016004831	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III-IV grado sanguinanti. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	10/08/2016	6529	63 ANNI	2016004828	998.11 - EMORRAGIA COMPLICANTE UN INTERVENTO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Sanguinamento precoce dopo STARR con Contour Transtar.
Paziente in posizione litotomica, inserimento di CAD da 33mm e reperto di minima diastasi della sutura dalle ore 9 alle ore 12. Punti staccati in Vicryl 2-0 di emostasi. Posizionamento di garza vaselinata nel retto e di emostatico fibrillare sulla linea di sutura.

1	10/08/2016	17233	68 ANNI	2016004830	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore 2, introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore 12 di orificio interno a livello del canale anale di fistola rettilinea intersfinterica bassa. Fistulectomia. Emostasi. Zaffo iodoformico della cavità.

1	10/08/2016	16712	48 ANNI	2016004839	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario sanguinante, Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di ragade anale posteriore

1	16/08/2016	17145	63 ANNI	2016004914	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.22 - COLECISTECTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	---	-------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisioine ombelicalew con l'introduzione del I trocar,dopo un tentativo di procedere in laparoscopia si converte in openj per motivo degli aderenze pregressi da gastroresezione Incisione xifo ombelicale in corrispondenza della pregressa cicatrice chirurgica . All'apertura del peritoneo si apprezza omento con numerosi aderenze che copre la colecisti e Sollevato l'omento, la colecisti si presenta di distesa . Colecistectomia anterograda fino ad isolare dotto ed arteria cistica che vengono isolati e sezionati su lacci. Controllo dell'emostasi. Lavaggi multipli della cavità addominale. Posizionamento di drenaggio tipo Blake 19 nel letto colecistico. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.

1	16/08/2016	19145	23 ANNI	2016004917	566 - ASCESSO ANALE E RETTALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-------------------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

esplorazione dell ano retto e del perineo reperto di fistola perianale alle ore 11 transfinterica con l'individuazione dell'orifizio esterno ed interno fistolectomia parziale con il posizionamentop di setone elastico a drenar.emostasi garza iodoformico

1	16/08/2016	11589	65 ANNI	2016004920	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso con tre punti a paracadute ant e tre posteriore , si esegue Retto-Retto Anastomosi Starr secondoi Longo con Doppia PPH. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	17/08/2016	17235	52 ANNI	2016004941	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	17/08/2016	16390	42 ANNI	2016004939	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	24/08/2016	17254	84 ANNI	2016005050	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	24/08/2016	17018	40 ANNI	2016005054	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	48.35 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL RETTO
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di polipo anorettale alle ore 7 si procede alla escissione del polipo .emostasi invio all'esame istologico.garza vasellinata in sede

1	24/08/2016	19105	65 ANNI	2016005057	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di stenosi anorettale serrata.dilatazione del canale anale.reperto di lesione della parete del retto alle ore 4-5ulcerata a cratere che si estende in alto per circa 6cm .biopsia .invio all'esame isatologico

1	25/08/2016	16127	50 ANNI	2016004978	540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE	47.09 - ALTRA APPENDECTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione cutanea pararettale detra Apertura della cavità addominale e reperto di appendicite retrocecale con flogosi sclerosante intensa Appendicectomia, affondamento del moncone appendicolare mediante confezionamento di borsa da tabacco. Emostasi. negativa dell'ultima ansa ileale e . Chiusura a strati della parete addominale.drenaggio Cute in filo.

1	31/08/2016	17089	66 ANNI	2016005188	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS si procede alla STARR secondo lungo conh doppia PPH 03 antriore e 01 posteriore consolidando il prolasso con 6 punti a paracadute.emostasi garza vasellinata in sede.

1	31/08/2016	12492	37 ANNI	2016005193	565.1 - FISTOLA ANALE	49.11 - FISTULOTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di fistola pereianale transfinterica con individuazione degli orifizi ,interno alle ore 12 l'esterno alle ore 2 si procede alla fistolectomia parziale con il setone elastico a drenare.garza iodofornica in sede

1	31/08/2016	16990	48 ANNI	2016005192	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	31/08/2016	15739	41 ANNI	2016005197	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	07/09/2016	16586	50 ANNI	2016005306	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele con prolappo sintomatico per ODS. si procede al consolidamento del prolappo con 6 punti a paracadute
scomposizione del prolappo con echilon45 in anteriore e posteriore secondo la tecnica di Longo TRANSTAR con 6 caricatore.emostasi con punti transfissi in vicryl
.zaffo vasellinato in sede

1	13/09/2016	20401	81 ANNI	2016005441	569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO	45.62 - ALTRA RESEZIONE PARZIALE DELL'INTESTINO TENUE
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Incisione mediana sovra-sottombelicale. All'apertura del peritoneo presenza di liquido bilio-enterico (circa 1000cc) con alcuni residui alimentari non digeriti. Le anse del tenue prossimale sono distese. A livello medio-ileale presenza di agglomerato di anse adese fra loro con soluzione di continuità della parete di una di esse di circa 1cm. A valle le anse sono di dimensioni normali. Lisi delle aderenze. Resezione del segmento ileale coinvolto con EEA L-L antiperistaltica con doppia stapler Echelon flex Powered 60mm carica blu. Lavaggi accurati della cavità. Posizionamento di due drenaggi tipo Blake 24Fr: sinistro nella pelvi, destro in doccia parietocolica destra. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.

1	14/09/2016	17523	64 ANNI	2016005474	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	14/09/2016	17257	26 ANNI	2016005494	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio gluteo sn cutaneo di fistola pilonidale trasversa. Incisione cutanea trasversa a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati cute in filo

1	21/09/2016	17695	38 ANNI	2016005655	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolappo emorroidario di 3° grado circonferenziale. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vasellinato nel canale anale.

1	28/09/2016	17311	53 ANNI	2016005791	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
Reperto di rettocele con prolappo sintomatico per ODS. si procede alla esterizzazione del prolappo con 6 punti a paracadute.3 anteriore e tre posteriore.STARR secondo Longo con TRANSTAR CON 5+1 cartucce con LA SCOPOSIZIONE DEL PROLASSO CON ECHILON 45 emostasi gartza vasellinata in sede

1	28/09/2016	18038	69 ANNI	2016005798	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	05/10/2016	14977	53 ANNI	2016005969	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	05/10/2016	17819	56 ANNI	2016005971	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di prolasso rettale con rettocele sintomatico p'er ODS.si procede all'esteriorizzazione del prolasso con 6 punti a paracadute.scomposizione del prolasso con echilon 45 e STARR secondo Longo con TRANSTAR .utilizzando 5+1 cartucce.emostasi con punti ntransfissi in vicryl garza vasellinata in sede

1	09/10/2016	20956	82 ANNI	2016006060	865.04 - TRAUMATISMO DELLA MILZA,SENZA MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ, MASSIVA DISTRUZIONE PARENCHIMALE	41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
---	------------	-------	---------	------------	--	----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione addominale mediana xifo ombelicale. Alla apertura della cavità addominale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico quantizzato in circa .400..... cc.

Lussazione manuale della milza che presenta una vasta lacerazione a tutto spessore con gemizio ematico in atto. Sezione ed emostasi dei legamenti spleno colico, spleno diaframmatico e spleno gastrico. Sezione dell'ilo splenico e legatura vascolare del peduncolo. Controllo degli altri visceri addominali senza rilevare altre fonti di sanguinamento. Lavaggio della cavità peritoneale e perfezionamento della emostasi della loggia splenica con falda emostatica fibrillare. Posizionamento di tubo di drenaggio Blake Drain 24 f. in loggia splenica. Sintesi della parete per piani. Cute in filo.

1	12/10/2016	20672	75 ANNI	2016006122	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.in paziente operata per prolassectomia secondo longo con dolore pelvico cronico intenso con costante impiego degli analgesici

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e con 6 punti a paracadute si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03 anteriore e 0'3 posteriore .emostasi9 con punti transfissi in vicryl .zaffo vaselinato in sede

1	12/10/2016	17439	40 ANNI	2016006123	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	12/10/2016	18361	70 ANNI	2016006127	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	13/10/2016	14289	34 ANNI	2016006141	569.2 - STENOSI DEL RETTO E DELL'ANO	96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------------------	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperito di stenosi anale serrata in corrispondenza del pregresso intervento di prolassectomi secondo Longo effettuata il 03/02/16 si procede alla dilatazione manuale della stenosi che si lascia passare con facilità con lieve gemizio ematico con stasi fecale a monte .garza vasellinata in sede da rimuovere nel pomeriggio per passara alla dilatazione con il Dilatan 27 ,e 28 alla dimensione

1	19/10/2016	18393	41 ANNI	2016006264	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di polipo retto anale asportazione del polipo con Legasure emostasi invio all'esame istologico

1	19/10/2016	17753	63 ANNI	2016006263	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
reperito di voluminoso rettocele asimmetrico sintomatico per ods.si procede alla estreiorizzazione consolidando il prolasse con 6 punti a paracadute . scomposizione dello stesso in anteriore e posteriore con echilon 60 STARR secondo Longo Con TRANSTAR.emostasi.garza vasellinata in sede

1	19/10/2016	17555	53 ANNI	2016006272	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperito di prolasse emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	26/10/2016	18079	50 ANNI	2016006443	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Viscerolisi per liberazione di alcune aderenze visceroparietali . Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Sutura in pds di sopragitto sulla precedente . Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	26/10/2016	18256	39 ANNI	2016006456	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperito di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasse e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	26/10/2016	18269	81 ANNI	2016006447	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Previa irrigazione dello sbocco cutaneo della fistola perianale ad ore 7 e visualizzazione dello sbocco a livello di ore 5 di una cripta anale, si incannula agevolmente la fisola, si esegue fistulotomia parziale della porzione cutanea e si posiziona un laccio di "setone" a drenare senza trazione. Si zaffa con garza iodoformica l'incisione cutanea.

1	26/10/2016	18054	58 ANNI	2016006444	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperito di prolasse emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	09/11/2016	18073	42 ANNI	2016006742	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di voluminoso rettocele sintomatico per ODS con prollasso rettale.consolidamento del prollasso con 6 punti a paracaduti .scomposizione del prollasso in ant e posteriore-STARR secondo Longo con TRANSTAR 5+1 cartucce .emostasi con punti transfissi in vicryl.zaffo vasellinato in sede

1	09/11/2016	18451	39 ANNI	2016006747	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	09/11/2016	17310	37 ANNI	2016006745	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario e mucoso del retto di IV grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	09/11/2016	18529	46 ANNI	2016006744	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario con esito di ascesso sottomucoso ore7 . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	10/11/2016	17320	70 ANNI	2016006785	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	16/11/2016	4683	57 ANNI	2016006894	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	18/11/2016	17310	37 ANNI	2016006938	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Repewrto di proctorragia in paziente operato per prolassectomia secondo longo il 09/11/16

con gemizio ematico alle ore 7/8 .emostasi con punti trnasfissi in vicryl con emostatico Floseal dalle ore 5 alle ore9.zaffo vasellinato in sede

1	23/11/2016	18783	83 ANNI	2016007044	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	23/11/2016	18635	70 ANNI	2016007036	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
<p>Reperto di rettocele di media entità con prolasso mucoso esterno alle ore 9 sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla starr secondo lungo con 2 PPH 03 anteriore e 01 posteriore emostasi con punti transfissi in vicryl .garza vasellinatya in sede</p>						
1	23/11/2016	18587	66 ANNI	2016007040	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
<p>Posizione litotomica,reperto di pereneo disceso con prolasso emorroidario di III grado posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura.Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.</p>						
1	30/11/2016	18452	47 ANNI	2016007196	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
<p>incisione inguinale sn reperto di ernia inguinale diretta sn.si proce4de alla liberazione del sacco erniario e sua riduzione in addome plicazio della trasversalis con plastica secondo trabucco con rete di prolene .emostasi .sintesi dei tessuti .cute in filo</p>						
1	30/11/2016	18259	47 ANNI	2016007206	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
<p>Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso Star secondo Longo con Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore.emostasi .zaffo vasellinato in sede</p>						
1	30/11/2016	19110	50 ANNI	2016007205	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
<p>Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vasellinato nel canale anale.</p>						
1	05/12/2016	19088	57 ANNI	2016007324	551.01 - ERNIA FEMORALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,RICORRENTE,CON GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
<p>Incisione inguinale obliqua dx.reperto di ernia inguinale destra recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, e sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo</p>						
1	05/12/2016	18633	67 ANNI	2016007322	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
<p>Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.</p>						
<p>reperto di prolasso rettale con rettocele discreto sintomatico per ods.consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute scomposizione dello stesso in anteriore e posteriore con echilon 45.STARR secondo lungo con TRANSTAR.6 cartucce emostasi garza vasellinata in sede</p>						
1	05/12/2016	19633	40 ANNI	2016007323	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
<p>Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.</p>						
1	14/12/2016	19566	51 ANNI	2016007488	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reaperto di voluminoso rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS e peroneo discendente si preocede al consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute.scomposizione del prolasso con echilon 45 mm STARR secondo Longo con TRANSTR 6+1 cartucce.emostasi .garza vasellinata in sede

1	14/12/2016	19722	38 ANNI	2016007501	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperito di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute .scomposizione del prolasso con echilon 45mm

STARR secondo Longo con TRANSTAR con 6cartucce.emostasio .garza vasellinata in sede

1	16/11/2016	18559	72 ANNI	2016006897	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperito di colecistite cronica distesa adesa all'omento , isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colectomia. drenaggioControllo dell'emostasi. Chiusura delle brecche per piani. Cute in filo.

1	02/01/2017	22582	85 ANNI	2016007742	728.89 - ALTRI DISTURBI DEI MUSCOLI,DEI LEGAMENTI E DELLE FASCE	54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Incisione sottombelico-pubica. reperito di vasto ematoma dei mm retti, del Retzius fino al retroperitoneo lombo-aortico. Presenza di appendicite acuta con piccolo ascesso posteriore e lesione di consistenza aumentata del fondo cecale. Appendicectomia anterograda con resezione del fondo cecale con Echelon flex powered 60mm carica blu. Drenaggi tipo Blake: inferiore 24 Fr pericecale e nel Douglas; superiore 19Fr in aspirazione nel contesto dei muscoli adominali. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.

1	03/01/2017	22599	17 ANNI	2017000040	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	-------	---------	------------	------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi serrata. Emostasi.

Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid

Medicazione con Gentalyn crema

1	05/01/2017	22605	90 ANNI	2017000028	552.21 - LAPAROCELE POST-INCISIONE,CON OSTRUZIONE	53.51 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione sopr-sottombelicale.reperito di voluminoso laparocele intasato con sacco erniario contenente anse intestinsle.reduzione in addome dello stesso .con piccolo difetto della fascia addominale .sutura a punti staccati con prolene 00 .della paret addominale emostasai.sintesi dei tessuti

1	06/01/2017	22672	44 ANNI	2017000152	566 - ASCESSO ANALE E RETTALE	49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
---	------------	-------	---------	------------	-------------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione e drenaggio di ascesso pereianale anteriore alle ore 1 con fuoriuscita di materiale purulento lavaggio con H2O2 E AMUKINA.zaffo iodoformico in sede

1	06/01/2017	22673	89 ANNI	2017000154	567.9 - PERITONITE NON SPECIFICATA	54.11 - LAPARATOMIA ESPLORATIVA
---	------------	-------	---------	------------	------------------------------------	---------------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di addome acuto con RX diretta addome e TC addome con pneumoperitoneo e versamento peritoneale in paziente con diagnosi accertata di leucemia linfatica cronica

incisione mediana sopr-sottombelicalde con reperto di abbondante versamento di liquido corpuscolato circa 2500 toilette del cavo peritoneale con l'invio all'esame colturale e batteriologico esplorazione dei visceri addominale .stomaco duodeno digiuno ,ileo e colon fino al retto con l'introduzione del blue di metelene per lo stomaco e duodeno .negative per perforazione .il sigma e diverticolare senza alcun segno di flogosi ,non segni di nperforazione ne di fibrina con il peritoneo viscerale integro translucido dopo il lavaggio peritoneale.drenaggio in addome chiusura della parete addominale a strati

1	11/01/2017	18253	64 ANNI	2001700254	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con Stratafix prolene e Prolene 0. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Utilizzo di due kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e tre emiborse posteriori in PDS nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo (anteriore PPH 03. posteriore PPH 01). Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto.

1	11/01/2017	22101	61 ANNI	2017000250	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolapsate di III grado. Voluminoso polipo mucoso che viene asportato. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi. Asportazione di marische cutanee. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	11/01/2017	19743	46 ANNI	201700251	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	-----------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolapsate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	01/06/2016	17282	74 ANNI	2016003444	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	18/01/2017	19966	52 ANNI	2017000470	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	18/01/2017	19092	34 ANNI	2017000475	565.1 - FISTOLA ANALE	49.11 - FISTULOTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di fistola perianale anteriore sottosfinterica con orizzio esterno alle ore 2

si individuano gli orifizzi intero ed esterno.previo incannulamento del trgetto mfistoloso.fistolectomia .emostasi .zaffo iodoformico

1	18/01/2017	19505	47 ANNI	2017000471	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	25/01/2017	19721	67 ANNI	2017000753	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
reperito di rettocele ostrottivo sintomatico per ODS.si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore con 6 punti a paracadute tre anteriore e tre posteriore.emostasi						
1	25/01/2017	19739	80 ANNI	2017000750	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperito di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.						
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e si procede alla STARR secondo longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore .emostasi .garza vasellinata in sede						
1	01/02/2017	19698	48 ANNI	2017000915	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
reperito di rettocele di III grsado di Marti in paziente operata per prolassectomia secondo Longo.si procede alla STARR secondo Longo con la TRANSTAR .esponendo e consolidando il prollasso con 8 punti a paracadute						
scomposizione dello stesso con ECHILON 45 .resezione con TRANSTAR 7 caricatore.emostasi..zaffo vasellinato in sede.						
1	01/02/2017	19699	29 ANNI	2017000921	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore7, introduzione di Blu di Metilene e reperito ad ore di orificio interno a livello del canale anale di fistola rettilinea itransfinterica						
Fistulectomia parziale con il setone a drenare. Emostasi.						
Zaffo iodofornico della cavità						
1	01/02/2017	20031	50 ANNI	2017000924	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperito di emorroidi prollassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vasellinata in ampolla rettale.						
1	01/02/2017	19632	45 ANNI	2017000925	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperito di prollasso emorroidario .						
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	08/02/2017	19863	52 ANNI	2017001064	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperito di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, e sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo						
1	08/02/2017	20272	75 ANNI	2017001067	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.						

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	15/02/2017	21049	82 ANNI	2017001226	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di prollasso di cupola vaginale esterno di III grado in paziente operata per isterectomia e di colecistectomia Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si cerca di liberare gli aderenze tenace dai pregressi interventi chirurgici .si rende necessario di procedere in open con incisione ombelico pubica lisi aderenziale apertura del peritoneo vaginale e del peritoneo parietale a livello del promontorio sacrale si procede alla sutura della rete di prolene 4x11 cm alla parete liberata della cupola vaginale con staratafix di prolene e a sua volta fissata al promontorio sacrale con Protac.emostasi con fibrillare in sede chiusura del peritoneo sulla rete di prolene .chiusura della parete addominale .a strati						
1	15/02/2017	19723	66 ANNI	2017001232	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	20/02/2017	23681	27 ANNI	2017001382	540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta retrocecale ascendente Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo						
1	22/02/2017	19864	79 ANNI	2017001420	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm.repèerto di prollasso di cupola vaginale in paziente operata per isterosalpingectomia Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
reperto di prollasso rettale sintomatico per ODS si procede alla prolassectomia secondo longo.con nPPH 03.emostasi.garza vasellinata in sede						
1	22/02/2017	19529	57 ANNI	2017001415	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	23/02/2017	23762	87 ANNI	2017001386	153.3 - TUMORI MALIGNI DEL SIGMA	45.76 - SIGMOIDECTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incisione sopraombelico pubica .reperto di occlusione intestinale con notevole ectasia del digiuno,dell'ileo e del colon dx trasverso e discendente da stenosi neoplastica serrata neoplastiche coinvolge il sigma con il giunto sigma retto e abbondante liquido libero in addome e di localizzazione neoplastica sul grande omento.mobilizzazione del sigma rewto e si procede all'intervento di resezione del sigma con la contour 40 con colostomia sn secondo Hartman. emostasi .drenaggio .sintesi dei tessuti						
1	01/03/2017	23365	56 ANNI	2017001589	785.6 - LINFOADENOMEGALIA	40.29 - ASPORTAZIONE SEMPLICE DI ALTRE STRUTTURE LINFATICHE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
piccola incisione inguinocrurale destra di circa 3cm.reperto di linfonodo inguinocrurale teso elastico di colore nerastro.biopsia escissionale del linfonodo.si invia all'esame istologico.sintesi dei tessuti.cute in filo						

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	01/03/2017	6311	57 ANNI	2017001591	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con protac. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
1	08/03/2017	20105	55 ANNI	2017001738	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di coleciste litiasica isolamento e sezione su clips del dotto cistico e dell'arteria cistica. Colectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.						
1	08/03/2017	23367	76 ANNI	2017001745	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel propteritoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
1	08/03/2017	20102	67 ANNI	2017001744	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
reperto di perineo discendente con prolasso emorroidario di III grado prolassectomia secondo Longo con PPH 03.emostasi.zaffo vasellinato in sede						
1	09/03/2017	23111	21 ANNI	2017001772	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore12 alla radice dello scroto verso il passo con lo specillo verso l'ano.dissezione del tram9ite fistoloso . fistolectomia .zaffo iodoformico . escissione di ragade anale posteriore fistolizzata.emostasi						
1	14/03/2017	23537	30 ANNI	2017001858	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (M.LUDOVICI):						
Voluminosa ernia inguino scrotale sx Incisione cutanea inguinale trasversa. Aperta la fascia muscolare ed isolato il funicolo si reperta voluminosa ernia inguino scrotale. Si riducono i visceri erniati.Si isola e resecta il sacco erniato. Emostasi. Plastica con plug e rete di prolene sec Trabucco. Sutura della fascia muscolare. Sutura sottocute, cute.						
1	15/03/2017	20351	70 ANNI	2017001893	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo. Reperto di prolasso retto emorroidario con rettocele sanguinante. si procede alla STARR secondo lungo con Doppia PPH 03 parete ant del retto e 03 parete posteriore del retto tramite consolidamento del prolasso con tre punti ant e tre posteriore. emostasi. zaffo vasellinati in cavità

1	15/03/2017	8129	77 ANNI	2017001915	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	15/03/2017	20659	58 ANNI	2017001911	565.0 - RAGADE ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Previa irrigazione dello sbocco cutaneo della fistola perianale ad ore 6 su ragade anale posteriore. fistolectomia emostasi zaffo iodofornico in sedi

1	22/03/2017	20477	36 ANNI	2017002088	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	22/03/2017	20662	69 ANNI	2017002096	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per posizionare trocar da 12 mm e sotto visione di 2° trocar da 12 mm in fianco dx e 3° e 4° trocar da 5 mm in fianco sn e regione sovrapubica. Reperto di retto adeso lassamanete alla cupola vaginale da cui viene liberato per via smussa ed Ultracision. Liberazione del retto posteriormente sulla fascia presacrale a partire dal promontorio fino al piano perineale, dissociando il retto poi dalla parete posteriore vaginale a cui risulta tenacemente adeso come probabile esito di pregresso intervento chirurgico di isterectomia, sino ad ottenere la completa mobilizzazione laterale sn del retto. Fissaggio distalmente di rete di prolene 6 cm x 11 cm alla parete posteriore vaginale con tre punti staccati di prolene 0, ribaltata la rete verso l'alto si esegue ulteriore sutura di fissaggio in continua con Stratafix 2/0, infine ulteriore ancoraggio prossimale con due punti di Prolene 2. Si procede infine all'ancoraggio del bordo prossimale della rete al promontorio sacrale con numerose Protack. Controllo dell'emostasi. Ripertoneizzazione con Stratafix 3/0. Chiusura della breccia dei trocars per piani. Cute in filo

1	29/03/2017	22036	52 ANNI	2017002239	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene a "V" e suo fissaggio con quattro punti di prolene n° 0. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo. Reperto di voluminoso rettocele e prolasso rettale sintomatico per ODS. Si procede al posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso, scomposizione dello stesso con Echelon 45 mm. Resezione del prolasso con tecnica STARR con Transtar secondo Longo utilizzando 5 ricariche. Controllo dell'emostasi, zaffo vaselinato in ano retto.

1	29/03/2017	20619	46 ANNI	2017002242	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della parete vaginale anteriore scollando la vescica con estrema difficoltà per la presenza di un utero voluminoso. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con tre punti di prolene n.0 al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico

Al termine della procedura si apprezza pneumo nel sacco urinario per cui si esegue cistoscopia con reperto di piccolo foro nella mucosa vescicale che non necessita di trattamento chirurgico immediato. Controllo dell'emostasi; drenaggio tipo blake n. 19 nel douglas. Sintesi degli accessi per piani.

Posizionamento di catetere urinario.

Cute in filo.

Si sprasiede al momento al trattamento del rettocele

1	05/04/2017	10123	63 ANNI	2017002419	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	05/04/2017	21367	49 ANNI	2017002428	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODs. si procede al consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute-scomposizione del prolasso con echiol 45 ore 3 e ore 9

STARR secondo Longo con TRANSTAR utilizzando 6 ricariche emostasi garza vasellinata in sede

1	05/04/2017	22170	34 ANNI	2017002426	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	06/04/2017	24689	73 ANNI	2017002415	997.4 - COMPLICAZIONI GASTROINTESTINALI, NON CLASSIFICATE ALTROVE	54.59 - ALTRE LISI DI ADESIONI PERITONEALI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione sora -sottombelicale .reperto di quadro di occlusione intestinale da volvolo della ansa efferente anastomizzata estremamente distesa ,passata per via transmesocolica lateralmente a destra all'ansa anastomizzata con lo stomaco da difetto transmesocolico con piccolo foro sull'ansa nel punto stenotico del bassaggio con perdita di liquido enterico chiaro, formando un ernia interna

riduzione dell'ernia interna con la derotazione del volvolo.rafia dell'ansa con sutura a doppio strato di vicryl.emostasi.esplorazione della cavita addominale dei visceri e del fegato non segni di recidive neoplastiche.toilet del cavo peritoneale.drenaggio endo addominale.sintesi dei tessuti

1	11/04/2017	24760	72 ANNI	2017002504	865.04 - TRAUMATISMO DELLA MILZA, SENZA MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ, MASSIVA DISTRUZIONE PARENCHIMALE	41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
---	------------	-------	---------	------------	---	----------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione addominale mediana xifo ombelicale. Alla apertura della cavità addominale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico quantizzato in circa .1600cc sangue e coaguli.

Lussazione manuale della milza che presenta una vasta lacerazione a tutto spessore con gemizio ematico in atto. Sezione ed emostasi dei legamenti spleno colico, spleno diaframmatico e spleno gastrico. Sezione dell'ilo splenico e legatura vascolare del peduncolo. Controllo degli altri visceri addominali senza rilevare altre fonti di sanguinamento. Lavaggio della cavità peritoneale e perfezionamento della emostasi della loggia splenica con falda emostatica fibrillare. Posizionamento di tubo di drenaggio Blake Drain 24 f. in loggia splenica. Sintesi della parete per piani. Cute in filo.

1	12/04/2017	20921	58 ANNI	2017002582	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	12/04/2017	22209	57 ANNI	2017002577	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Paziente in posizione ginecologica, previo adeguato massaggio sfinteriale si posiziona CAD per eseguire con pds 2\0 paracadute all'apice del prolasso che si estende sino al margine del CAD stesso. Apertura del prolasso ad ore 3 e 9 con Echelon 45 mm e resezione dello stesso con Transtar mediante applicazione di 6 ricariche. Controllo dell'emostasi con punti di vicryl, tampone vaselinato in anoretto.

1	20/04/2017	21254	44 ANNI	2017002742	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di rettocele di II grado di Mattee.si posizionano 6 punti a paracadute per sospendere e consolidare il prolasso rettale .scomposizione dello stesso con la suturatrice echiloni alle ore 3 e 9.starr secondo longo con TRANSTAR 6 caricatore.emosatasoi zaffo vasellinato in sede

1	20/04/2017	12987	71 ANNI	2017002744	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	20/04/2017	20867	63 ANNI	2017002747	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III gradoasimmetrico di IV grado dalle ore 2 alle 6 . Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	20/04/2017	21227	70 ANNI	2017002749	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di fistola transfinterica alle ore 3 si individua l'orifizio interno ed esterno della fistola.si procede alla fistolectomia parziale con il setone elastico a drenare.emostasi.zaffo iodofornico in sede

1	25/04/2017	25003	45 ANNI	2017002822	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Divulsione anale digitale.Reperto di ragade anale posteriore fistolizzata transfinterica ore 6 con intenso ipertono sfinteriale Inserimento di anoscopio ed Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizionamento di setone elastico a drenare .
medicazione a piatto

1	26/04/2017	6470	46 ANNI	2017002841	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	------	---------	------------	--------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di polipo rettale sulla rima di sutura in pazienrte operata per prolassectomia secondo longo.asportazione del polipo
Reperto di voluminoso rettocele con prolasso rettale sintomatico per ODS.si procede all posizionamento di 6 punti a paracadute con il consolidamento e la sospensione del prolasso.scomposizione dello stesso con Echilon 60 alle ore 3 e 9.si procede alla TRANSTAR secondo Longo con 5+1 caricatore. emostas. garza vasellinata in sede

1	26/04/2017	22334	61 ANNI	2017002840	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.contenente voluminoso fecaloma solipdo del retto-asportazione del fecaloma
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	26/04/2017	21231	78 ANNI	2017002836	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario e rettale .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	26/04/2017	24636	76 ANNI	2017002838	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	27/04/2017	24636	76 ANNI	2017002838	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Previo posizionamento di CAD si esegue anoscopia con reperto di gemizio ematico da ore 6 ad ore 8. Emostasi con punti di vicryl transfissi e infiltrazione di Adrenalina diluita. Tampone vaselinato ano-rettale ricoperto di tabotamp fibrillare.

1	02/05/2017	18305	51 ANNI	2017002893	566 - ASCESSO ANALE E RETTALE	49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
---	------------	-------	---------	------------	-------------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Paziente operato per ascesso perei anale a ferro di cavalloReperto di fistola anale alle ore 3 trapassante fino alle ore 6 con andamento extra sfinterico lavaggio con H2O2 e Amukina.garza iodoformica alle ore 3 in cavità ascessuale e un altro zaffo iodoformico alle ore 6.

1	03/05/2017	21365	47 ANNI	2017002965	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di prolene. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD e reperto di prolasso rettoanale il cui apice raggiunge il sino al margine esterno del CAD, previo punti a paracadute in PDS si esegue scomposizione del prolasso con Echelon 45 mm e successiva sua resezione con Transtar utilizzando 5 ricariche. Controllo dell'emostasi sulla rima di sutura in vicryl. Tampone vaselinato in anoretto

1	03/05/2017	21646	50 ANNI	2017002973	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di prolene. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Introduzione del CAD e reperto di prolasso rettale il cui apice giunge al margine esterno del CAD stesso. Posizionamento di punti a paracadute in PDS, scomposizione del prolasso con Echelon 45 mm e sua resezione con Transtar utilizzando 6 ricariche. Controllo dell'emostasi mediante punti di vicryl sulla linea di sutura. Tampone vaselinato in anoretto

1	03/05/2017	20990	56 ANNI	2017002964	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	10/05/2017	21255	47 ANNI	2017003099	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di rettocele di II,III grado si procede alla STARR secondo Longo con TRANSTAR esteriorizzazione e consolidamento del prolasso con 6 punti a paracadute tre anteriore e tre posteriore.scomposizione dello stesso con Echilon 60 alle ore 3 ve 9.Starr con transtar 6 caricatore.emostasi .garza vasellinata in sede

1	10/05/2017	21735	39 ANNI	2017003104	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vasellinato nel canale anale.escissione di ragade anale.escissione di ragade anale.

1	10/05/2017	21701	31 ANNI	2017003105	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone vasellinato nel canale anale.

1	17/05/2017	20379	76 ANNI	2017003255	550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sinistra. reperto di ernia inguinale recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affidamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Lechtenstein Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon

1	17/05/2017	21644	62 ANNI	2017003262	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	17/05/2017	22100	39 ANNI	2017003267	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS.
 Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore.
 emostasi .garza vasellinata in sede

1	17/05/2017	23711	45 ANNI	2017003261	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario recidivo di III , IV grado in operato di prolsectomia sec.longo. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	17/05/2017	22674	65 ANNI	2017003259	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
 Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	18/05/2017	3037	79 ANNI	2017003284	574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON ALTRA COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	22/05/2017	21699	81 ANNI	2017003356	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Incisione inguinale obliqua sin. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione del funicolo e reperto di ernia inguinale diretta. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia trasversalis, emostasi. Apertura del funicolo ed esplorazione negativa per presenza di ernia inguinale obliqua esterna. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo.

1	22/05/2017	20324	78 ANNI	2017003362	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	22/05/2017	23434	77 ANNI	2017003360	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di rettocele con prolasso rettale di III grado sintomatico per ODS.sospensione e condolidamento del prolasso co 6 punti a paracadute e sua scomposizione in ant e posteriore con echilon .si pprocede alla STARR secondo Longo con TRANSTAR 6 caricatori
 emostasi garza vasellinata in cavità.garza in vagina

1	23/05/2017	23711	45 ANNI	2017003396	998.11 - EMORRAGIA COMPLICANTE UN INTERVENTO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto ndi proctorragia in paz operatoper prolassectomia secondo Longo emostasi chirurgica.zaffo vasellinato in sedeo

1	24/05/2017	15509	57 ANNI	2017003412	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	24/05/2017	21619	53 ANNI	2017003420	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	24/05/2017	21733	53 ANNI	2017003417	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycryl, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	24/05/2017	21698	48 ANNI	2017003416	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	24/05/2017	21852	33 ANNI	2017003421	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	31/05/2017	21989	53 ANNI	2017003551	553.1 - ERNIA OMBELICALE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.41 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE CON PROTESI
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Incisione cutanea sovraombelicale Isolamento del sacco erniario e sua riduzione in addome. Plastica con rete tipo Ventralex. Controllo dell'emostasi. Sottocute e cute in filo.

1	31/05/2017	22884	70 ANNI	2017003564	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	31/05/2017	22568	65 ANNI	2017003562	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di >4cm sintomatico per ODS.con fecalome ricorrente Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	07/06/2017	25391	54 ANNI	2017003687	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 0 al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di voluminoso prolasso rettale esterno della lunghezza di almeno 7 cm. Riduzione dello stesso su garza e posizionamento di CAD per confezionare paracadute con punti di PDS a tutto spessore parietale rettale per estroflettere l'apice del prolasso stesso. Scomposizione del prolasso con Echelon Flex 45 mm e resezione con Contour Transtar mediante applicazione di n° 6 ricariche. Controllo dell'emostasi in vicryl sulla rima di sutura e posizionamento di garza vaselinata in ano-retto.

1	07/06/2017	23242	50 ANNI	2017003707	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	14/06/2017	22129	75 ANNI	2017003824	550.11 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA, RICORRENTE, CON OSTRUZIONE, SENZA MENZIONE DI GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Presenza di ematoma sottocutaneo e sottogasciale formatosi in corso di anestesia locoregionale in regione crurale che viene evacuato. Si reperta voluminosa ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario, chelectomia, emostasi. Plicatura della fascia transversalis in PDS 2/0. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon

1	16/06/2017	19980	66 ANNI	2017003864	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di voluminoso rettocele con pèrolasso rettale sintomatico per ods. consolidamento e esteriorizzazione del prolasso con 6 punti a paracadutu. scomposizione dello stessop con echilon 45mm alle ore 3e 9. Starr secondo longo con TRANSTAR. utilizzando 6 caricatore. emostasi garza vaselinata in sede

1	16/06/2017	21650	50 ANNI	2017003870	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	16/06/2017	22172	51 ANNI	2017003871	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di voluminoso prolasso emorroidario di III grado sanguinante con ciste sebacea alle ore 1 asportazione della ciste con prolassectomia secondo longfo con PPH 03. emostasi con punti transfissi in vicryl. garza vaselinata in sede

1	21/06/2017	22127	37 ANNI	2017003965	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	---------------------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa con pareti ispessite isolamento e sezione su clips del dotto cistico che appare lievemente ectasico e dell'arteria cistica. Colectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	21/06/2017	21804	38 ANNI	3975	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di cistocele sintomatico con incontinenza urinaria e cistite recorrente
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Reperto di Voluminoso rettocele con prollasso rettale sintomatico per ODS sospensione e consolidamento del prollasso rettale con 6 punti a paracadute tre anteriore e tre posteriore.scomposizione dello stesso alle ore 3 e 9 con echilon 45mm.si procede alla STARR secondo Longo con TRANSTAR utilizzando 6 caricatore.emostasi con punti in vicryl transfissi .zaffo vasellinato in sede

1	23/06/2017	21924	63 ANNI	2017004030	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	28/06/2017	4935	38 ANNI	2017004117	785.6 - LINFOADENOMEGALIA	40.11 - BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE
---	------------	------	---------	------------	---------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di lkingfonodo in regione sopraioidea sotto mentoniera .si procede alla incisione trasversa di circa 3 cm.asportazione di linfonodo.emosatasi sintesi dei tgesstui

1	28/06/2017	22041	56 ANNI	2017004122	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di voluminoso rettocele in paziente operata per prolassectomia altrove si procede alla esterizzazione e consolidamento del prollasso con 6 punti a paracadute.scomposizione dello stesso ore 3 e 9.STARR secondo Longo con TRANSTAR con l'utilizzo di 6 cartucce.emostasi .sintesi dei tessuti.garza vasellinata in sede

1	28/06/2017	22177	69 ANNI	2017004125	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore5 , introduzione di Blu di Metilene e reperto ad ore di orificio interno a livello del canale anale di fistola rettilinea transfenterica.fistolectomia parziale con il setone a drenare .emostasiZaffo iodoformico della cavità

1	28/06/2017	24641	70 ANNI	2017004104	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prollasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	28/06/2017	23214	41 ANNI	2017004118	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, reperto di nodulo emorroidario esterno trombizzato dlle ore 4 alle pore 7.escissione con il legasure.emostasi

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	29/06/2017	24641	70 ANNI	2017004104	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto ndi gemizio ematico con proctorragia in paziente operato per prolassectomia sec lungo il 28/06/17 con piastrinopenia cronica.emostasi con punti transfissi in vicryl.si infila la sutura con adrenalina 1f portata a 10ml di fisiologica zaffo vasellinato con fibrillare.						
1	20/07/2017	22461	68 ANNI	2017004591	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.						
1	22/07/2017	26654	60 ANNI	2017004619	154.3 - TUMORI MALIGNI DELL'ANO,NON SPECIFICATO	46.11 - COLOSTOMIA TEMPORANEA
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):						
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale con posizionamento di trocar da 12mm e sotto visione di altri 2 trocar da 5 mm in ipocondrio e fossa iliaca destra. Presenza di numerose aderenze omento parietali che vengono lisate in parte per via smussa in parte per tagliente. Individuazione del sigma medio e sua liberazione dalla doccia parietocolica sinistra. Incisione a livello della fossa iliaca sinistra in posizione pararettale. Apertura di fascia e peritoneo ed estrazione del colon a doppia canna. Controllo dell'emostasi. Fissaggio del colon alla fascia con 6 punti di Vicryl. Passaggio della bacchetta al di sotto del colon. Chiusura della cute della breccia della colostomia. Chiusura del foro di trocar da 12 mm per strati. Cute in filo. Al termine si posiziona sachelto da stomia e si apre la colostomia stessa.						
1	25/07/2017	23559	25 ANNI	2017004655	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	26/07/2017	22464	53 ANNI	2017004676	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.rende necessario dell'utilizzo della TRANSTAR Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	01/08/2017	23992	58 ANNI	2017004772	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):						
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.						
1	02/08/2017	26745	60 ANNI	2017004733	574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON ALTRA COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. colecistite acuta litiasica distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.						

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	19/07/2017	22279	74 ANNI	2017004568	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di III,IV grado asimmetrico . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	19/07/2017	25715	77 ANNI	2017004564	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di voluminoso enterocele con prolasso di cupola.Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con Protac. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
1	19/07/2017	22666	36 ANNI	2017004569	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	25/07/2017	22574	46 ANNI	2017004651	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vycryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	26/07/2017	23705	41 ANNI	2017004669	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
Posizionamento di CAD.con ipotono sfinteriale Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicyrl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.						
1	26/07/2017	22993	68 ANNI	2017004677	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso retto emorroidario di IV grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	25/07/2017	23033	62 ANNI	2017004649	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti litiasica normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.						

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	09/08/2017	23442	40 ANNI	2017004924	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	09/08/2017	22555	34 ANNI	2017004925	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	16/08/2017	23041	62 ANNI	2017005039	550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA, RICORRENTE, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Incisione inguinale obliqua dx in pregressa ernioplastica con incisione trasversa. Reperto di voluminosa ernia inguinale recidiva che fuoriesce in toto dall'anello inguinale esterno, difficoltosa apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno e liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento rtecidivante. Difficoltoso isolamento del sacco erniario e sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	16/08/2017	25594	65 ANNI	2017005041	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	---

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Previo adeguato massaggio sfinteriale con difficoltà si riesce ad eseguire anoscopia per apprezzare esiti di ragade anale fistolizzata con ponte mucoso fibrotico ad ore 6 che viene sezionato. Si apprezzano multiple neoformazioni fibrotiche polipoidi come da esiti di tromboflebite estena. Si eseguono asportazione delle neoformazioni con bisturi elettrico. Controllo dell'emostasi mediante posizionamento di garza di Tabotamp

1	16/08/2017	22777	36 ANNI	2017005042	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Previo cannulamento con specillo di orificio cutaneo perianale posto ad ore 2 si evidenzia fistola anale transfinterica bassa con orificio interno posto ad ore 12. Si esegue fistulectomia parziale con posizionamento di setone elastico. Controllo dell'emostasi, zaffo iodoformico della cavità.

1	23/08/2017	21734	50 ANNI	2017005177	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	23/08/2017	26646	76 ANNI	2017005174	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di polipo dell anoretto alle ore 9 si procede alla asportazione del pèolipo con il legasure.emostasi

1	23/08/2017	23078	50 ANNI	2017005175	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (M.MALERBA):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone nel canale anale.

1	24/08/2017	6304	86 ANNI	2017005195	569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO	46.73 - SUTURA DI LACERAZIONE DELL'INTESTINO TENUE ECCETTO IL DUODENO
---	------------	------	---------	------------	--------------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Laparotomia mediana sovraombelico-pubica sulla precedente cicatrice. All'apertura della cavità presenza di aderenze visceroparietali che vengono lisate. Presenza di abbondante (circa 500cc) materiale enterico in tutti i recessi con peritoneo iperemico e fibrinoso come da peritonite diffusa di non recente insorgenza. La nota ernia inguinale sinistra ha in sigma al suo interno come in uno scivolamento. Adeso al versante antimesenterico dello stesso è presente un insieme di anse ileali agglomerate da aderenze tenaci; un'ansa appare con parete ischemica e presenta due perforazioni di circa 1 cm con fuoriuscita di materiale enterico. Raffia delle perforazioni. Anche il ceco appare iperemico come da pregressa diastasi, ma con pareti integre. Toilette della cavità addominale con abbondanti lavaggi. Chiusura del difetto erniario inguinale sinistro avvicinando il peritoneo parietale. Drenaggio tipo Blake 24 Fr nello scavo retto-vescicale. Chiusura della parete a strati. Cute in filo.

1	30/08/2017	23275	68 ANNI	2017005309	550.93 - ERNIA INGUINALE BILATERALE, RICORRENTE, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.17 - RIPARAZIONE BILATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (M.MALERBA):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale diretta. recidiva. Isolamento del sacco erniario con una certa difficoltà a causa della presenza della pregressa rete sua riduzione in addome ed emostasi. Plastica erniaria con plicatura della fascia trasversalis , mesh in prolene e Plastica sec la tecnica di Lichtenstein . Chiusura a strati della parete. Cute in filo.

Incisione inguinale obliqua sn .Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale diretta. recidiva. Isolamento del sacco erniario con difficoltà per la presenza della pregressa rete,,sua riduzione in,addome, emostasi. Plastica erniaria con plicatura della fascia trasversalis . mesh in prolene e plastica sec. la tecnica di Lichtenstein Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	30/08/2017	20619	47 ANNI	2017005307	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato in sede

1	30/08/2017	24700	50 ANNI	2017005306	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
asportazione di polipo pedunculato del retto

1	06/09/2017	23789	73 ANNI	2017005433	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon

1	06/09/2017	10865	71 ANNI	2017005442	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di voluminoso cistocele che si esteriorizza dalla parete anteriore vagina .con rettocele sintomatico per ODS.Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V\zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	06/09/2017	27396	85 ANNI	2017005391	560.81 - ADERENZE INTESTINALI O PERITONEALI CON OCCLUSIONE (POSTOPERATORIO) (POSTINFETTIVO)	54.59 - ALTRE LISI DI ADESIONI PERITONEALI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Incisione xifo-pubica su pregressa cicatrice, apertura della cavità addominale con presenza di discreta quantità di liquido sieroso che viene prelevato per invio culturale. Abnorme distensione di tutto il colon che le cui parti risultano tuttavia sane in assenza di segni di sofferenza, dal ceco sino alla pregressa anastomosi colo-colica in FIS dove è presente area fibroso-aderenziale che obbliga il colon a monte ad un inginocchiamento occludente senza segni di recidiva di malattia. Liberazione con tagliante del viscere dalle aderenze con visualizzazione dell'area anastomotica che risulta perfettamente pervia consentendo lo svuotamento per compressione meccanica di aria e feci contenute nel colon a monte. Controllo di tutta la cavità addominale negativo per recidiva di malattia. Controllo dell'emostasi. Posizionamento transanale di sonda rettale sino oltre l'area del pregresso inginocchiamento viscerale e suo fissaggio con punto transfisso alla radice della coscia sn. Chiusura a strati della parete addominale in vicryl a punti staccati, cute in nylon 3\09

1	13/09/2017	24259	66 ANNI	5636	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V\zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	20/09/2017	24328	68 ANNI	2017005768	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V\zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele di media entità sintomatico per ODS si rende sufficiente l'utilizzo di PPH 03 previo posizionamento di borsa di tabacco di filo 1 PDS. prolasso secondo Longo. emostasi .zaffo vaselinato in sede

1	20/09/2017	22898	55 ANNI	2017005764	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	20/09/2017	24817	44 ANNI	2017005763	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	22/09/2017	24603	58 ANNI	2017005834	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO): Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinale obliqua esterna Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon						
1	22/09/2017	22700	39 ANNI	2017005836	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.						
1	22/09/2017	23618	34 ANNI	2017005842	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO): Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati. Cute in Nylon 2\0.						
1	27/09/2017	24558	58 ANNI	2017005934	618.04 - RETTOCELE	48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI TESSUTI PERIRETTALI
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI): Induzione dello pneumoperitoneo con ago di Verres nel Punto di Palmer. Introduzione con guida ottica di primo trocar da 12mm in fossa iliaca destra e di secondo (12mm) e terzo (5mm) rispettivamente sopra la cicatrice del pregresso intervento per onfaloccele ed in fossa iliaca sinistra. Presenza di aderenze visceroparietali che dall'ombelico decorrono fino in fossa iliaca sinistra, spalmando il sigma alla parete. Nonostante la lisi delle aderenze suddette la visualizzazione della pelvi è ridotta. Impossibilità di esporre la parete vaginale anteriore per la presenza di abbondante tessuto adiposo omentale e delle frange epiploiche del sigma che non liberano la pelvi, non potendo posizionare la paziente oltre i 10° di Trendelenburg per l'aumento delle pressioni polmonari di picco. Non è possibile pertanto procedere all'intervento di POPS come programmato. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.						
Utilizzo di due kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 emiborse anteriori e tre emiborse posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo (anteriore PPH 03, posteriore PPH 01). Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto.						
1	27/09/2017	22173	72 ANNI	2017005937	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI): Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.						
1	04/10/2017	22132	60 ANNI	2017006144	574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,CON OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER): Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.						
1	04/10/2017	22570	77 ANNI	2017006149	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Presenza di omento adeso alla parete addominale anteriore su pregressa cicatrice mediana ombelico-pubica che viene lisato con forbici a freddo ed elettrocoagulazione. A livello della pelvi si lisano numerose aderenze tra le anse ileali e il peritoneo pelvico sino ad esporre la vagina e la vescica. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di prolasso retta-ale di media entità che riempie la metà del CAD per cui si decide di eseguire STARR con doppia PPH previo posizionamento di punti a paracadute all'apice del prolasso per resecare prima la parete rettale anteriore con PPH03 e successivamente la parete posteriore con PPH01. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	04/10/2017	22323	67 ANNI	2017006148	565.0 - RAGADE ANALE	96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Presenza di setone ad ore 6 posizionato in altra sede per fistola sottosfinterica su ragade.

Incannulamento con specillo e fistulotomia, controllo dell'emostasi, posizionamento di garza tipo Tabotamp e medicazione a piatto

1	11/10/2017	24720	56 ANNI	2017006298	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto per via endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di piccolo rettocele recidivo. Si esegue prolassotomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	11/10/2017	24815	49 ANNI	2017006301	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di voluminoso rettocele di 5cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica oro, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	11/10/2017	27001	46 ANNI	2017006299	565.0 - RAGADE ANALE	96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Paziente in posizione litotomica. In anosopia presenza di voluminosa ragade posteriore di consistenza callosa come da cronicizzazione e polipo sentinella all'apice. Massaggio sfinteriale prolungato con divulsione del canale anale. Cauterizzazione della lesione ed asportazione del polipo sentinella. Emostasi con apposizione di Tabotamp.

1	12/10/2017	24815	49 ANNI	2017006301	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di proctorragia post operatoria in paz operata per STRARR con TRANSTAR con gemizio ematico .emostasi mediante punti transfissi ij vicryl zaffo vaselinato in sede con fibrillare

1	18/10/2017	24721	51 ANNI	2017006434	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	18/10/2017	9223	68 ANNI	2017006424	553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.61 - RIPARAZIONE DI ERNIA SU INCISIONE CON PROTESI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Incisione periombelicale sn, liberazione del sacco erniario di laparocele ombelicale e sua resezione per evidenziare difetto fasciale di circa 3 cm. Emostasi e posizionamento intraperitoneale di Mesh tipo Ventralax L fissata con punti circolari in PDS 2\0. Chiusura della fascia residua. Sottocute in monocryl, cute in nylon.

1	20/10/2017	28310	53 ANNI	2017006493	540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa .

Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. Nello scavo retto-vescicale è presente liquido corpuscolato che viene aspirato.drenaggio Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo

1	21/10/2017	28322	79 ANNI	2017006503	883.1 - FERITA DELLE DITA DELLA MANO CON COMPLICAZIONI	82.46 - SUTURA DI MUSCOLI O FASCE DELLA MANO
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

revisione di ferita da strumento da taglio sulla mano sinistra con emorragia in atto . Previo posizionamento di tourniquet si esp0lora la ferita che mostra lacerazione dei piani muscolari senza evidenza di lesioni tendinee, Sgonfiando il tourniquet si dimostra gemizio ematico per lo piu' dei ventri muscolari per cui si procede ad emostasi con bisturi elettrico e sutuira dei capi muscolari. Sintesi per piani cutanea . Medicazione compressiva

1	26/05/2017	21698	48 ANNI	2017003416	998.11 - EMORRAGIA COMPLICANTE UN INTERVENTO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di proctorragia in paz operato per prolassectomia secondo longo.emostasi chirurgica con punti transfissi in vicryl dalle ore 5 alle ore8.zaffo vasellinato in sede

1	25/10/2017	24610	63 ANNI	2017006577	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di voluminosa intussuscezione retto-rettale sintomatica per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica bianca, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Asportazione di marisca cutanea. Zaffo vaselinato nel retto.

1	25/10/2017	24942	55 ANNI	2017006579	618.04 - RETTOCELE	48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI TESSUTI PERIRETTALI
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS.

Utilizzo di due kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare (anteriore PPH 03, posteriore PPH 01) 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 punti a paracadute anteriori e tre posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo. Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto.

1	25/10/2017	25388	68 ANNI	2017006581	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	08/11/2017	20426	65 ANNI	2017006896	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V \zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. plastica della prete addominale per ernia ombelicale Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	08/11/2017	22926	25 ANNI	2017006905	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in seta.

1	08/11/2017	25689	59 ANNI	2017006907	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	10/11/2017	24596	52 ANNI	2017006944	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta del pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti modestamente distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	10/11/2017	25438	42 ANNI	2017006943	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	15/11/2017	24612	48 ANNI	2017007028	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V \zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	15/11/2017	25437	63 ANNI	2017007043	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di voluminoso nodulo emorroidario anteriore alla ore 11-3 strozzato dolente. asportazione con il legasure
all'esplorazione rettale si apprezza una lesione ulcerata infiltrante la parete antero laterale su che si estende dalle ore 12 fino ore 4
Biopsia con invio all'esame istologico. emostasi. garza vasellinata in sede

1	15/11/2017	24792	37 ANNI	2017007041	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	15/11/2017	28231	65 ANNI	2017007046	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di ragade anale posteriore cronica con ipertono sfinteriale con gemizio ematico ad
ore 6. devulsione del canale anale Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizionamento di zaffo vasellinato endorettale .

1	21/11/2017	26263	61 ANNI	2017007156	618.84 - PROLASSO DEL MONCONE CERVICALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di voluminoso rettocele di 5cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon
45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl
3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	21/11/2017	24791	51 ANNI	2017007159	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento
della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	21/11/2017	28881	86 ANNI	2017007055	550.11 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA, RICORRENTE, CON OSTRUZIONE, SENZA MENZIONE DI GANGRENA	53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Incisione inguinale obliqua sinistra su pregressa cicatrice da ernioplastica . Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa
ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome : emostasi. Isolamento dell'anello inguinale
interno che appare abnormemente slargato con estensione laterale Plastica erniaria con plug e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura
a strati della parete. Cute in Nylon

1	29/11/2017	25939	58 ANNI	2017007319	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, in paziente con la poliomielite dell'arto inf sinistro con prolasso retto emorroidario di III, IV grado sanguinante posizionamento di
CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi
Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	29/11/2017	28307	60 ANNI	2017007327	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di lesione polipoide soffice che si estende dalle ore 11 alle ore 3 infiltrante la
mucosa si sospende con due punti di vicryl e si asporta con pinza emostatica legasure. si invia all'esame istologico sutura della mucosa con punti staccati in
vicryl. zaffo vasellinato in sede

1	29/11/2017	28696	54 ANNI	2017007326	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	48.35 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL RETTO
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di ragade anale posteriore cronica con polipo anorettale voluminoso si procede alla devulsione del canale anale, cauterizzazione della ragade con
asportazione del polipo

1	29/11/2017	25384	75 ANNI	2017007325	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	29/11/2017	27717	66 ANNI	2017007334	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	06/12/2017	28800	66 ANNI		569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	48.35 - ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DEL RETTO
---	------------	-------	---------	--	--------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di ragade anale posteriore con ipertono sfinteriale e polipo del retto .si procede alla divulsione del canale anale .asportazione del polipo del retto che viene inviato all'esame istologico
elettrocouterizzazione della ragade.zaffo vasellinato in sede

1	06/12/2017	28615	77 ANNI	2017007478	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario sanguinante .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	06/12/2017	25577	45 ANNI	2017007477	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	06/12/2017	28394	70 ANNI	2017007455	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario voluminoso mdi III grado sanguinante in paz in trattamento con terapia anticoagulante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	16/12/2017	29340	89 ANNI	2017007641	552.00 - ERNIA FEMORALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,CON OSTRUZIONE	53.21 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA CRURALE CON INNESTO O PROTESI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale trasversa. Reperto di ernia crurale strozzata. Liberazione ed apertura del sacco erniario con reperto di omento che viene ridotto in addome, chiusura del sacco erniario. Emostasi. Plastica erniaria con plug in prolene ed abbassamento del legamento inguinale sul legamento pettineo in punti staccati di Vycril. Chiusura a strati della parete. cuti in nfilo

1	02/01/2018	29538	69 ANNI	2017007435	785.6 - LINFOADENOMEGALIA	40.11 - BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE
---	------------	-------	---------	------------	---------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione trasversa in regione ascellare sn
per linffadenopatia sistemica biopsia di due voluminose linfonodi con l'invio all esame istologico.emostasi
drenaggio sintesi dei tessuti

1	14/01/2018	29765	80 ANNI	2018000307	865.02 - TRAUMATISMO DELLA MILZA,SENZA MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ, LACERAZIONE CAPSULARE,SENZA MAGGIORE DISTRUZIONE DEL PARENCHIMA	41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
---	------------	-------	---------	------------	--	----------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

Incisione addominale mediana xifo sotto ombelicale. Alla apertura della cavità addominale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico quantizzato in circa 600 cc.

Lussazione manuale della milza che presenta disinserzione del peduncolo vascolare con gemizio ematico in atto. Sezione ed emostasi dei legamenti spleno colico, spleno diaframmatico e spleno gastrico fino ad isolare e sezionare l'ilo splenico con Ligasure. Controllo degli altri visceri addominali senza rilevare altre fonti di sanguinamento. Si reperta un ematoma del legamento gastrocolico, in prossimità della grande curvatura gastrica, che viene sezionato e sottoposto ad evacuazione ed emostasi Aspirazione della cavità peritoneale e perfezionamento della emostasi della loggia splenica con falda emostatica fibrillare. Posizionamento di tubo di drenaggio Blake Drain 24 f. in loggia splenica. Sintesi della parete per piani. Cute in filo.

1	17/01/2018	24787	51 ANNI	2018000383	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n°56 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	17/01/2018	25181	42 ANNI	2018000394	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	17/01/2018	27980	44 ANNI	2018000397	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	13/01/2018	29762	85 ANNI	2018000301	560.2 - VOLVOLO	45.74 - RESEZIONE DEL COLON TRASVERSO
---	------------	-------	---------	------------	-----------------	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Laparotomia esplorativa con incisione sopraombelico pubica.reperto di peritonite purulenta con pneumoperitoneo da perforazione di volovolo del sigma a livello del sigma distale al di sopra del giunto retto sigma.
il colon si presenta notevolmente ectasico dal retto fino al colon trasverso che appare interessato da neoplasia stenosante a manicotto.
si procede quindi a emicolectomia sin allargata al III medio del colon, con affondamento del retto su echelon 60 e confezionamento stomia sul trasverso a dx della linea mediana.
toilette cavità peritoneale. drenaggio in sede
chiusura parete a strati.

1	24/01/2018	5944	67 ANNI	2018000593	574.10 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON ALTRA COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	------	---------	------------	---	---------------------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. reperto di colecistite cronica litiasica . Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi.emostasi con fibrillare .drenaggio. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	24/01/2018	24970	52 ANNI	2018000591	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 7cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	31/01/2018	25755	75 ANNI	2018000749	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V \zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele e previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso esi procede alla STARR secondo Longo con PPH 03 anteriore e PPH 01 posteriore.emostasi con punti di vicryl .zaffo vasellinato in sede

1	31/01/2018	23440	59 ANNI	2018000744	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Repereto di voluminoso cistocele con incontinenza urinaria conclamata .Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	31/01/2018	5489	63 ANNI	2018000750	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Incannulamento di orificio cutaneo perianale ad ore 9 con reperto ad ore 10 di orificio interno a livello del canale anale di fistola transfinterica. Fistulectomia parziale fino al piano muscolare. Emostasi. Zaffo iodoformico della cavità.

1	31/01/2018	25670	35 ANNI	2018000751	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	02/02/2018	25461	55 ANNI	2018000820	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	02/02/2018	24561	35 ANNI	2018000816	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	02/02/2018	26079	38 ANNI	2018000817	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.
asportazione di polipo anale

1	07/02/2018	25603	69 ANNI	2018000959	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	08/02/2018	30271	52 ANNI	2018000972	566 - ASCESSO ANALE E RETTALE	49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
---	------------	-------	---------	------------	-------------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di ascesso perianale posteriore a ferro di cavallo incisione e drenaggio.lavaggio con H2O2 e Amukina
zaffo iodoformico in sede

1	14/02/2018	26671	61 ANNI	2018001123	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	14/02/2018	25331	55 ANNI	2018001122	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele di 4cmsi procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH; pre con PPH 03 anteriore e PPH 01 posteriore Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	21/02/2018	25721	59 ANNI	2018001256	618.04 - RETTOCELE	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele altamente sintomatico per ODS e utilizzo cosatante di lassative e clisme evacuative che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	27/02/2018	26728	77 ANNI	2018001379	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (G.BENAIM):

Incisione ombelicale e posizionamento del primo trocar da 12mm in open .

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" in prolene e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	28/02/2018	5904	42 ANNI	2018001402	564.02 - COSTIPAZIONE CON DISFUNZIONE DELLO SBOCCO	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	28/02/2018	26097	54 ANNI	2018001403	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti litiasica normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.

1	28/02/2018	25254	52 ANNI	2018001401	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	07/03/2018	25690	50 ANNI	2018001566	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele di I grado con lieve prolasso rettale sintomatico per ODS in paz operata per prolassectomia circa 8 anni fa si procede alla prolassectomia retto emorroidaria con nPPH 01. previo posizionamento di borsa di tabacco secondo la tecnica di lingo.emostasi .sintesi dei tessuti .zaffo vasellinato in sede

1	07/03/2018	25729	64 ANNI	2018001569	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	14/03/2018	30079	71 ANNI	2018001743	785.6 - LINFOADENOMEGALIA	40.11 - BIOPSIA DI STRUTTURE LINFATICHE
---	------------	-------	---------	------------	---------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

incisione in regione inguinale destra , in corrispondenza di tumefazione clinicamente rilevabile ; si reperta un voluminoso linfonodo al di sotto della fascia cribrosa che si asporta per intero con la capsula intatta. Sutura per piani: quelli sottocutanei con vivcyl 3/0 e cutanei con nylon 3/0

1	14/03/2018	25941	71 ANNI	2018001756	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vasellinato nel retto.

1	14/03/2018	21227	71 ANNI	2018001752	566 - ASCESSO ANALE E RETTALE	49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
---	------------	-------	---------	------------	-------------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di fistola anale rettilinea con orifizio esterno ore 3 si incannula con lo specillo e si individua l'orifizio interno alle ore 1.fistolectomia .emostasi si reperta inoltre una raccolta ascessuale incistata in corrispondenza del setto retto -vaginale .si individua e si drena per via transrettale con escissione della membrana piogena .emostasi garza vasellinata in sede

1	14/03/2018	27519	62 ANNI	2018001753	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di fistola perianale sottosfinterica alle ore 3 si individualo gli orifizi interno ed esterno .fistolectomia.emostasi .zaffo iodofornico in sede

1	18/03/2018	30682	84 ANNI	2018001009	567.21 - PERITONITE (ACUTA) DIFFUSA	54.19 - ALTRA LAPARATOMIA
---	------------	-------	---------	------------	-------------------------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione su recente pregressa ferita chirurgica sottoxifo ombelico pubica.reperto di peritonite diffus con abbondante liquido purulente ibn addome di cui si aspira circa 20ml per esame coltiurale .reperto di deiscenza anastomotica coloretale con necrosi dei monconi anastomotici con intensa flogosi circostante per cui si procede alla toilette della cavita addominale .conj l'esplorazione dei viscere ..
sio esegue la chiusura a doppio strato del moncone rettale.e si confeziona la colostomia secondo l'intervento di hartmann.emostasi e drenaggio in cavità pelvica.sintesi dei tessuti a strati

1	21/03/2018	28494	85 ANNI	2018001914	553.8 - ERNIA DI ALTRI SITI SPECIFICATI,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.69 - RIPARAZIONE DI ALTRA ERNIA DELLA PARETE ADDOMINALE ANTERIORE CON PROTESI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

incisione obliqua inguinale sinistra , in corrispondenza della tumefazione erniaria . Reperto di voluminosa ernia di Spigelio. Isolamento del sacco e sua riduzione in addome . Controllo dell'emostasi. Plastica con posizionamento di mesh Ventralex 8 cm in posizione properitoneale , solidarizzata al difetto fasciale con sutura in prolene a punti staccati . Sintesi del piano fasciale e della parete per piani. Cute iun Nylon

1	21/03/2018	26027	67 ANNI	2018001917	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V\zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	21/03/2018	25675	63 ANNI	2018001920	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	28/03/2018	24325	50 ANNI	2018002030	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V\zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	03/04/2018	26112	75 ANNI	2018002125	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V\zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

reperto di rettocele di circa 4cm previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si esegue Retto-Retto Anastomosi Starr secondo Longo con Doppia PPH 01 . Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	03/04/2018	19556	62 ANNI	2018002126	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di voluminoso rettocele di 6cm con prolasso rettale esterno sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon60 mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	03/04/2018	26589	33 ANNI	2018002131	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	03/04/2018	27132	76 ANNI	2018002132	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di III grado.
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	03/04/2018	25254	52 ANNI	2018002133	619.1 - FISTOLA ENTERO-GENITALE,FEMMINILE	46.11 - COLOSTOMIA TEMPORANEA
---	------------	-------	---------	------------	---	-------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.BIANCHI):

Incisione periombelicale e induzione dello pneumoperitoneo introducendo un primo trocar da 5 mm. Un secondo trocar sotto visione in fossa destra. Il sigma è lungo e compliant per cui si esegue incisione pararettale sinistra e si confeziona colostomia a doppia canna sul sigma, terminalizzata (escludente), fissata a fascia con 4 punti di sutura.
Chiusura delle brecche dei trocars.

Paziente in posizione ginecologica. L'esplorazione vaginale e rettale fa evidenziare la presenza di recedente intervento sulla fistola; i tessuti sono però ancora edematosi e sembra di apprezzare una recidiva di fistola di piccole dimensioni.

1	11/04/2018	26674	52 ANNI	2018002311	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di voluminoso rettocele sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD con fuoriuscita del prolasso oltre il margine esterno dello stesso; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica oro, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	19/04/2018	25698	63 ANNI	2018002523	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di voluminoso rettocele idi circa 6 cm 4cm con peròlasso rettale e emorroidario sanguinante sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	19/04/2018	27233	52 ANNI	2018002522	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	19/04/2018	27480	45 ANNI	2525	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	19/04/2018	23431	40 ANNI	2018002521	565.0 - RAGADE ANALE	96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di ragade anale posteriore con ipertono sfinteriale.divulzione del canale anale
cauterizzazione della ragade.emostasi

1	26/04/2018	16160	34 ANNI	2018002661	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele dio circa 4cm previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso esi procede alla STARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore-emostasi .garza vasellinata in sede

1	26/04/2018	27427	54 ANNI	2018002664	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di ragade anale

1	26/04/2018	28365	74 ANNI	2018002666	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	01/05/2018	31770	47 ANNI	2018002715	540.0 - APPENDICITE ACUTA CON PERITONITE	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta di aspetto mammellonato cerebrirme coartata si rende necessario l'asportazione della appendice con la sua base cecale con Echelon 60 controllo dell'emostasi drenaggio in sede.chiusura dei fori di trocars cute in filo

1	02/05/2018	3678	82 ANNI	2018002741	553.29 - ALTRO LAPAROCELE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.59 - RIPARAZIONE DI ALTRA ERNIA DELLA PARETE ADDOMINALE ANTERIORE
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

incisione cutanea longitudinale; reperto di ernia epigastrica con porta erniaria di circa 3 cm; liberazione e affondamento del sacco.emostasi accurata posizionamento di rete ventrale media con punti in prolene 2,0 chiusura parete a piani

1	02/05/2018	24668	61 ANNI	2018002744	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a v e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	05/05/2018	31853	18 ANNI	2018002826	569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO	46.73 - SUTURA DI LACERAZIONE DELL'INTESTINO TENUE ECCETTO IL DUODENO
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------------------	---

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

laparotomia sovra sottoombelicale . Reperto di abbondante liquido sieroso endoaddominale frammisto a diffusa presenza di fibrina libera e aderente al peritoneo viscerale delle anse ileali . Prelievo di liquido per esame colturale . Controllo delle anse del tenue fino a reperire lacerazione del versante mesenterico di ansa prossimale , a circa 10 cm dal Treitz . Raffia in PDS doppio strato. Controllo dei visceri addominali, negativo per lesioni di natura traumatica . Abbondante lavaggio della cavità addominale con soluzione fisiologica e betadine . Posizionamento di tubo di drenaggio di tipo Balck Drain 19 in prossimità della raffial digiunale . Sintesi della parete a strati . Cute in Nyfil 3/0

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	09/05/2018	21859	68 ANNI	2018002894	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo per la presenza di Obesita non e possibile esporre il campo operatorio pelvico dovuto alla impossibilit� di spostare i viscere.si soprasiede alla POPS laparoscopica Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n� 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.						
1	09/05/2018	27896	55 ANNI	2018002895	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	09/05/2018	27755	49 ANNI	2018002897	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	16/05/2018	27720	55 ANNI	2018003035	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica bianca, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n� 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl. Zaffo vaselinato nel retto.						
1	16/05/2018	28124	72 ANNI	2018003042	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):						
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.						
1	20/06/2018	27648	44 ANNI	2018003791	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.						
Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele di III grado che fuoriesce dal CAD di oltre 4cm sottovalutato dalla RX defecografia e come documentato dalla paziente con le foto e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n� 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.						
1	20/06/2018	27523	20 ANNI	2018003794	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in filo2/0.

1	20/06/2018	28099	48 ANNI	2018003801	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circumferenziale sanguinante con grosse gozzi emorroidarie . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril,escissione delle marische cutanee esterne tampone riassorbibile nel canale anale.

1	20/06/2018	29668	48 ANNI	2018003797	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	27/06/2018	27188	64 ANNI	2018003957	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele di III grado che fuoriesce dal CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	27/06/2018	27721	63 ANNI	2018003963	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolapsate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	27/06/2018	31123	50 ANNI	2018003961	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolapsate di IV grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	04/07/2018	29072	49 ANNI	2018004110	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
---	------------	-------	---------	------------	------------------------------------	----------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi serrata. Emostasi.
Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid
Medicazione con Gentalyn crema

1	04/07/2018	27752	53 ANNI	2018004114	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n°5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	04/07/2018	13943	50 ANNI	2018004112	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	04/07/2018	31943	38 ANNI	2018004113	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	11/07/2018	28096	58 ANNI	2018004259	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. reperto di prolasso di cupola vaginale con enterocele in paz isterectomizzata lisi naderenziale. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con protac Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	11/07/2018	28309	56 ANNI	2018004260	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto

1	11/07/2018	29820	73 ANNI	2018004263	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di fistola perianale posteriore ore 6 in corrispondenza di raghade anale .evidenziazione della fistola orifizio esterno ed interno ragade anale con gemizio ematico ad ore 6. fistolectomia con escissione della ragade anale in blocco Elettrocoagulazione del fondo della ragade. Posizionamento di zaffoin sede

1	18/07/2018	32440	38 ANNI	2018004406	574.20 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI SENZA MENZIONE DI COLECISTITE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa isolamento e sezione su clips del dotto cistico che appare lievemente ectasico e dell'arteria cistica. Colectectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle breccie per piani. Cute in filo.

1	18/07/2018	28156	60 ANNI	2018004410	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con 5 punti staccati in prolene al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	18/07/2018	32722	48 ANNI	2018004407	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario di IV grado sanguinante con polipo rettale. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, asportazione di gozzo esterno alle ore dalle ore 7 alle 11 con Legasure. tampone riassorbibile nel canale anale. asportazione di polipo rettale

1	19/07/2018	28759	62 ANNI	2018004431	550.92 - ERNIA INGUINALE BILATERALE, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.17 - RIPARAZIONE BILATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale diretta. Isolamento del sacco erniario, w sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plicatura della fascia trasversalis mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo.

Incisione inguinale obliqua sn Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale diretta. +piccola ernia indiretta Isolamento del sacco erniario, sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con plicatura della fascia trasversalis e mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	19/07/2018	31069	67 ANNI	2018004441	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 3cm sintomatico per ODS. con polipo del retto
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore. emostasi con punti transfissi in vicryl .zaffo vasellinato in sede.
asportazione di polipo del retto che viene inviato all'esame istologico

1	19/07/2018	28086	60 ANNI	2018004434	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	19/07/2018	28498	42 ANNI	2018004436	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	19/07/2018	2903	49 ANNI	2018004435	565.1 - FISTOLA ANALE	49.11 - FISTULOTOMIA ANALE
---	------------	------	---------	------------	-----------------------	----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di fistola perianale recidiva sottosfinterica alle ore 8
si individua e si incannula il tramite fistoloso sottosfinterico e si mette a piatto. emostasi .zaffo vasellinato in sede

1	24/07/2018	2920	47 ANNI	2018004520	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con doppia PPH 03 anteriore e 01 popsteriore . Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	24/07/2018	33199	67 ANNI	2018004193	518.82 - ALTRE INSUFFICIENZE POLMONARI, NON CLASSIFICATE ALTROVE	31.29 - ALTRA TRACHEOSTOMIA PERMANENTE
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (G.SOZIO):

incisione cutanea trasversa di circa 4 cm in corrispondenza del secondo / terzo anello cartilagineo tracheale . Apertura della fascia superficiale e media del collo sulla linea longitudinale anteriore con dissezione dei muscoli nastriformi anteriori del collo. Controllo della emostasi . Esposizione della trachea e sospensione degli anelli tracheali . Incisione mediana a I e successiva introduzione della cannula trachostomica contestualmente alla rimozione del tubo oro tracheale precedentemente in sede . Fissaggio della cannula con 2 punti di sutura e mediante insufflazione del palloncino di fissazione . Sutura del lembi cutanei esterni .

1	25/07/2018	29515	38 ANNI	2018004546	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V \zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele con prolasso retto emorroidario sanguinante; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso, si esegue Retto-Retto Anastomosi con tecnica STARR con doppia PPH 03 anteriore e 03 posteriore Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	25/07/2018	29269	28 ANNI	2018004549	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in Nylon 2\0.

1	25/07/2018	28529	52 ANNI	2018004550	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	25/07/2018	33212	77 ANNI	2018004533	574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA, CON OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale transerniario posizionando un primo trocar da 12 mm e sotto visione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti distesa con pareti ispessite come da colecistite acuta. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico (che risulta di calibro regolare) e dell'arteria cistica. Colecistectomia retrograda. Controllo dell'emostasi. Estrazione della colecisti in un bag. Riparazione dell'ernia ombelicale a punti staccati di PDS 1. Cute in filo.

1	26/07/2018	33226	52 ANNI	2018004570	540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI PERITONITE, PERFORAZIONE O ROTTURA	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	--	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta purulenta.

Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Estrazione dell'appendice dal troca da 12mm. Controllo emostasi. lavaggio della cavità. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo

1	22/08/2018	14963	79 ANNI	2018004967	550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA, RICORRENTE, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sinistra. sulla pregressa cicatrice chirurgica operato circa 25 anni fa altrove. reperto di voluminosa ernia inguinoscrotale ed esiti di tenace aderenze da pregresso intervento sec la tecnica di postemsky. isolamento dei piani muscolare e fasciale e isolamento del sacco erniario e sua riduzione in addome e dei elementi del funicolo spermatico. date le numerose e tenace aderenze si individua il rimanente del legamento inguinale si prepara il piano della fascia transversalis che viene plicata si procede alla plastica sec la tecnica di lichtenstein con rete di prolene fissata con punti staccati. sintesi dei tessuti .cuti in filo

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	22/08/2018	28894	64 ANNI	2018004974	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon						
1	22/08/2018	29332	70 ANNI	2018004973	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario con prolasso mucoso delò rewttto. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	22/08/2018	28232	64 ANNI	2018004971	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	22/08/2018	28396	38 ANNI	2018004977	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	29/08/2018	30287	68 ANNI	2018005096	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinoscrotale da scivolamento obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome plicazio della trasversalis emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon						
1	29/08/2018	28891	57 ANNI	2018005107	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione difficoltosa ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna a livello dell'anello inguinale interno. Isolamento del sacco erniario ed apertura dello stesso; controllo del contenuto, chiusura del sacco erniario e sua riduzione in addome, emostasi. Plastica erniaria con p mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo						
1	29/08/2018	29071	43 ANNI	2018005102	565.0 - RAGADE ANALE	96.23 - DILATAZIONE DELLO SFINTERE ANALE
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di ragade anale popsteriore fistolizzata con lieve ipewrtonosfinteriale con polipo del retto e gozzo emorroidario ore 7 divulzione del canale anale escissione della ragade e la fistola -asportazione del gozzo emorroidario con il Legasure emostasi						
1	29/08/2018	29495	76 ANNI	2018005097	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (S.PIZZOLEO):						
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso , si esegue Retto-Retto Anastomosi con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore . Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3(0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	29/08/2018	28700	51 ANNI	2018005101	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	01/09/2018	33728	82 ANNI	2018005173	459.0 - EMORRAGIA, NON SPECIFICATA	39.98 - CONTROLLO DI EMORRAGIA, SAI
---	------------	-------	---------	------------	------------------------------------	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

pz con etp della vulva metastatico linfonodale che presenta arto inferiore sin aumentato di dimensione come da compressione linfonodale e grossa ulcera neoplastica a forma di vasto cratere in regione inguino femorale di diametro 15 x 10 cm circa; ivi si apprezza emorragia arteriosa acuta a carico dell'arteria femorale sin che presenta vasta lacerazione e pareti friabili verosimilmente da infiltrazione neoplastica.

si esegue emostasi con punti di prolene 3.0 a monte e a valle dell'area emorragica.

emostasi con ausilio di garze emostatiche.

medicazione compressiva

1	05/09/2018	31161	54 ANNI	2018005251	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V \zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 4 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	05/09/2018	28802	40 ANNI	2018005246	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	12/09/2018	29015	57 ANNI	2018005370	550.92 - ERNIA INGUINALE BILATERALE, SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.17 - RIPARAZIONE BILATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinoscrotale obliqua esterna PL2. Isolamento del sacco erniario, riduzione in addome, emostasi. Plicatura della trasversalis e ricostruzione dell'anello inguinale interno in PDS 2/0. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

Incisione inguinale obliqua sn. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo, m che risulta lipomatoso, con reperto di ernia inguinale diretta PM1. Isolamento del sacco erniario, riduzione in addome, emostasi. Plicatura della trasversalis in PDS 2/0 e ricostruzione dell'anello inguinale interno. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo

1	12/09/2018	28153	59 ANNI	2018005377	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V \zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di prolasso retto-emorroidario rettocele che e rende necessario l'utilizzo della doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con doppia pph . Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	12/09/2018	28388	67 ANNI	2018005379	565.0 - RAGADE ANALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Repereto di ragade anale posteriore fistolizzata.escissione in blocco della ragade con asportazione vdelle maresche cutanee emostasi.zaffo vasellonato in sede

1	19/09/2018	30101	55 ANNI	2018005505	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	19/09/2018	28646	71 ANNI	2018005502	569.1 - PROLASSO RETTALE	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso rettop-emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	26/09/2018	27433	56 ANNI	2018005663	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di piccola invaginazione retto-rettale sintomatica per ODS. Si procede a prolassectomia sec.Longo con PPH 03. Punti emostatici in Vicryl sulla linea di sutura. Zaffo vaselinato nel retto.

1	26/09/2018	18968	45 ANNI	2018005662	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):

Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.

1	03/10/2018	29254	58 ANNI	2018005815	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti modestamente distesa. Isolamento e sezione su clips del dotto cistico dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	03/10/2018	30109	32 ANNI	2018005818	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati. Cute in seta 2\0.

1	03/10/2018	29549	61 ANNI	2018005817	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	03/10/2018	30577	53 ANNI	2018005819	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	10/10/2018	17753	65 ANNI	2018005958	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. per motivi tecniche e l'obesità endoaddominale e l'impossibilità di mobilizzare le anse intestinale e la preparazione del promontorio sacrale ve la mobilizzazione del sigma si procede in open con incisione ombelico-pubica. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a sinistra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 10 cm) e suo fissaggio con punti di sutura in prolene sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con Protac. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	10/10/2018	25254	53 ANNI	2018005953	619.1 - FISTOLA ENTERO-GENITALE, FEMMINILE	70.73 - RIPARAZIONE DI FISTOLA RETTOVAGINALE
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Paziente in posizione ginecologica, la esplorazione vaginale fa apprezzare area flogistica cronica con orificio fistoloso noto posizionato al passaggio fra il 1\3 medio e quello inferiore della parete posteriore. Infiltrazione di fisiologica a livello del setto retto-vaginale in modo da scollare il piano vaginale da quello rettale posteriore. Previo posizionamento di punti cardinali per esporre l'orificio, si esegue la sua escissione a losanga con margini laterali su tessuto vaginale sano. Scollamento con tagliente della parete vaginale dal piano rettale posteriore circonferenzialmente. Sutura della parete rettale posteriore a punti staccati di PDS 2/0 in senso longitudinale e successivamente della parete posteriore vaginale sempre in PDS 2/0 a punti staccati in senso trasversale in modo da ottenere piani di sutura sfalzati tra loro. Zaffo iodoformico vaginale.

1	17/10/2018	30460	53 ANNI	6100	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. reperto di voluminoso utero fibromatoso con numerosi fibrome b Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	17/10/2018	27009	74 ANNI	2018006111	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore emostasi con punti transfissi in vicryl Zaffo vaselinato in sede

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	17/10/2018	28890	48 ANNI	2018006109	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circumferenziale sanguinante di III grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	20/10/2018	34620	70 ANNI	2018006184	553.21 - LAPAROCELE POSTCHIRURGICO,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.69 - RIPARAZIONE DI ALTRA ERNIA DELLA PARETE ADDOMINALE ANTERIORE CON PROTESI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incisione sopraombelicale per laparoccele voluminoso non riducibile .con voluminoso sacco erniario contenente anse digiuno ileale strozzate con abbondante omento.isolamento del sacco erniario e sua sezione.controllo della vitalità delle anse intestinale che risulta soddisfacente .riduzione delle stessi .plastica della parete addominale con rete di proceed estesa 20x15 cm e suo fissaggio con punti di prolene .emostasi.sintesi dei tessuti.cute in filo						
1	24/10/2018	34369	60 ANNI	2018006260	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.04 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE INDIRETTA CON INNESTO O PROTESI
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):						
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna PL2. Isolamento del sacco erniario, riduzione in addome, emostasi. Ricostruzione dell'anello inguinale interno con plug. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo						
1	24/10/2018	27070	76 ANNI	2018006273	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.99 - ALTRI INTERVENTI SUL RETTO E SUI TESSUTI PERIRETTALI
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):						
Reperto di rettocele anteriore medio sintomatico per ODS. Utilizzo di due kit PPH per eseguire Retto-Retto Anastomosi Transanale con Stapler circolare (anteriore PPH 03, posteriore PPH 01) 33 mm (STARR) previo confezionamento di 3 punti a paracadute anteriori e tre posteriori in PDS 2\0 nel retto inferiore secondo la Tecnica di Longo. Emostasi in Vicryl 3\0 sulla rima di sutura ed affondamento delle due orecchiette laterali. Zaffo vaselinato nel retto.						
1	24/10/2018	26179	72 ANNI	2018006272	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):						
Reperto di perineo discendente con prolasso retto-emorroidario di IV grado sanguinante; discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Si segnala la presenza di colpocele posteriore e verosimilmente di enterocele non segnalato radiologicamente. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0 ed apposizione di falda di emostatico fibrillare. Zaffo vaselinato nel retto.						
1	24/10/2018	30940	62 ANNI	2018006264	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (D.INDIANI):						
Reperto di emorroidi prolassate di III grado. Si esegue prolassectomia secondo la tecnica di Longo con Stapler circolare 33 mm, previo posizionamento di KIT PPH 03 e confezionamento di borsa di tabacco in PDS. Emostasi a punti staccati in Vicryl sulla linea di sutura. Posizionamento di garza vaselinata in ampolla rettale.						
1	25/10/2018	31070	59 ANNI	2018006292	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):						
Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna a livello dell'anello inguinale interno. Isolamento del sacco erniario e sua riduzione in addome, emostasi. Plicatura della fascia trasversalis su plug in prolene con PDS 2/0. Plastica con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Cute in filo						
1	25/10/2018	31698	62 ANNI	2018006301	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	25/10/2018	30549	56 ANNI	2018006298	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	25/10/2018	34300	42 ANNI	2018006299	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario cirumferenziale sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	03/11/2018	21247	88 ANNI	2018006467	552.00 - ERNIA FEMORALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,CON OSTRUZIONE	53.21 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA CRURALE CON INNESTO O PROTESI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Incisione inguinale trasversa. Reperto di ernia cruraledestra strozzata. Liberazione ed apertura del sacco erniario con reperto di ansa intestinale congesta che viene ridotto in addome, chiusura del sacco erniario. Emostasi. Plastica erniaria con plug in prolene ed abbassamento del legamento inguinale sul legamento pettineo in punti staccati di Vycril. Chiusura a strati della parete. Cute in punti metallici						
1	14/11/2018	28155	38 ANNI	2018006682	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto asportazione di polipo rettoanale						
1	14/11/2018	29267	60 ANNI	2018006681	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di voluminoso rettocele di 4cm con prolasso rettale sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto						
1	14/11/2018	31072	70 ANNI	2018006683	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario di III grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.						
1	14/11/2018	34474	64 ANNI	2018006671	569.0 - POLIPO ANALE E RETTALE	49.39 - ALTRA ASPORTAZIONE O DEMOLIZIONE LOCALE DI LESIONE O TESSUTO DELL'ANO
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Divulsione anale digitale. Inserimento di anoscopio ed evidenziazione di polipi ano rettale con gemizio ematico asportazione di due polipi con l'invio all esame istologico emostasi .garza betadinata in sede						
1	14/11/2018	25391	55 ANNI	2018006632	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):						
Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS con prolasso retto anale emorroidario esterno sanguinante. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6+1 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. escissione di nodulo emorroidario esterno alle ore4.zaffo vasellinato in sede						
1	15/11/2018	28155	38 ANNI	2018006682	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Repereto di proctorragia in paz operata il 14/11/18 oer rettocele e prollasso rettale con la tecnica TRANStAR Gemizio ematico alle ore 6-8 .lavaggio con sol.fisiologica emostasi con punti transfissi e controllo della anastomosi che risulta nella norma.zaffo vasellinato in sedee

1	19/09/2018	31159	74 ANNI	2018005499	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo quarto trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. repero di tenace aderenze in paz operata per isterectomisa aApertura del peritoneo pelvico anteriore tsulla cupola vaginale. preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V \zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Repereto di prollasso rettale con rettocele che fuoriesce dal CAD er; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con la tecnica STARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore. Emostasi sulla linea di rica blusutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto.

1	29/11/2018	30633	67 ANNI	2018007005	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Repereto di laparoccele sopraombelicale in paz operato per ETP vescicale con neo vescica. apertura della parete addominale con lisi aderenziale e plastica della parete addominale conInduzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecche per piani. Cute in filo.

1	29/11/2018	30154	63 ANNI	2018007007	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Repereto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	29/11/2018	30459	55 ANNI	2018007012	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Repereto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto

1	29/11/2018	30525	45 ANNI	2018007010	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, repereto di prollasso emorroidario circumferenziale sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	29/11/2018	31907	22 ANNI	2018007008	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, repereto di prollasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	30/11/2018	31759	71 ANNI	2018007033	574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,CON OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti Idropica litiasica con parete ispessiti, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecche per piani. Cute in filo.

1	30/11/2018	29175	58 ANNI	7036	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	30/11/2018	32305	30 ANNI	20118007051	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	-------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario circumferenziale sanguinante. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	12/12/2018	31637	67 ANNI	2018007327	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con 4 punti a doppio passaggio di prolene al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	12/12/2018	31586	38 ANNI	2018007333	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vycril 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	12/12/2018	32699	66 ANNI	7379	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	12/12/2018	35161	24 ANNI	2018007337	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	14/12/2018	17722	48 ANNI	2018007386	569.1 - PROLASSO RETTALE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vycril 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	14/12/2018	31908	68 ANNI	2018007390	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	14/12/2018	32308	60 ANNI	2018007393	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario voluminoso di III grado circumferenziale. Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	14/12/2018	29547	46 ANNI	2018007392	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario voluminoso circumferenziale di III grado sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	15/12/2018	31586	38 ANNI	2018007419	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di proctorragia in paz.operata per rettocele con TRANSTARil 12/12/18 .gemizio ematico alle ore 6 .emostasi chirurgicacon punti transfissi in vicyrl controllo della sutura risulta nella norma
garza vasellinata in sede

1	17/12/2018	31586	38 ANNI	2018007419	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di gemizio ematico con proctorragia post intervento di STARR secondo Longo dalle ore 5 alle 8.emostasi con punti transfissi e garza emostatica di Tachosil .controllo dell'emostasi.garza fibrillare in sede

1	09/01/2019	30922	51 ANNI	2019000262	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con la tecnica STARR secondo Longo con doppia pph03 ANTERIORE E 03 POSTERIORE
emostasi.garza vasellinata in sede

1	09/01/2019	28501	51 ANNI	2019000259	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm sintomatico per ODS.
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	09/01/2019	31889	59 ANNI	2019000248	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	09/01/2019	23549	58 ANNI	2019000247	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	11/01/2019	28501	51 ANNI	2019000259	569.3 - EMORRAGIA DEL RETTO E DELL'ANO	49.95 - CONTROLLO (POSTOPERATORIO) DI EMORRAGIA DELL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

episodio di proctorragia con sangue rosso chiaro e alcune coaguli.in paz operata il 09/01/19 per STARR con TRANSTARR .reperito di modesto gemizio alle ore 12 e 3 .emostasi con punti transfissati in vicryl .garza vasellinata con fibrillare in sede

1	16/01/2019	31846	53 ANNI	2019000443	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con con punti di prolane a doppio passaggio al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	16/01/2019	31588	66 ANNI	2019000451	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 3/4 cm sintomatico per ODS. Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con doppia PPH 03 anteriore e 031 posteriore con tecnica STARR secondo Longo Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	16/01/2019	33410	50 ANNI	2019000458	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.asportazione di polipo anorettale

1	16/01/2019	33036	41 ANNI	2019000452	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	30/01/2019	33144	62 ANNI	2019000832	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sn. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno e si reperta voluminosa ernia inguinale diretta. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento, plicatura in Vicryl della fascia transversalis, emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene. Controllo emostasi e chiusura a strati della parete. Cute in nylon.

1	30/01/2019	32128	59 ANNI	2019000839	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	30/01/2019	33409	55 ANNI	2019000834	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	30/01/2019	32821	38 ANNI	2019000840	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	31/01/2019	30336	78 ANNI	2019000866	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	13/02/2019	34588	21 ANNI	2019001178	685.1 - CISTI PILONIDALE SENZA MENZIONE DI ASCESSO	86.21 - ASPORTAZIONE DI CISTI O SENO PILONIDALE
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Infusione sottocutanea mediante siringa ed ago bottonuto di Blu di Metilene attraverso orificio mediano cutaneo di fistola pilonidale. reperto di ciste pilonidale recidiva fistolizzata Incisione cutanea a losanga intorno al tramite fistoloso ed asportazione in blocco della cisti e dei tessuti circostanti fino alla fascia presacrale. Chiusura della breccia in Vicryl a punti staccati previo posizionamento di drenaggio in aspirazione. Cute in Nylon 2\0.

1	13/02/2019	31639	64 ANNI	2019001185	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di cistocele con prolasso di v9olta in paz operata pèer isterectomia.si procede alla pops secondo lungo con rete di prolene v 1 fissata con punti in prolene alla cupola vaginale con estrazione delle branche della rete per via smussa in posizione extra peritoneale e la loro fissazione alla fascia del muscolo obliquo esterno al di sopra delle spine iliaca peritonizzazione .sintesi dei tessuti
reperto di prolasso rettale con lieve rettocele si procede alla prolassectomia secondo lungo con pph 03.emostasi con punti staccati in vicryl .garza vasellinata in sede

1	13/02/2019	31880	51 ANNI	2019001193	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	13/02/2019	35643	51 ANNI	2019001188	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	27/02/2019	31768	56 ANNI	2019001514	550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sinistra.recidiva Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon

1	27/02/2019	17233	71 ANNI	2019001518	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 4cm con prolasso rettale sintomatico per ODS.in paz operata pere prolassectomia secondo lungo in altra sede
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi con la tecnica STARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto escissione di maresche cutanee con elettro bisture

1	27/02/2019	35324	46 ANNI	2019001517	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso retto emorroidario sintomatico per ODs . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. secondo la tecnica di longo Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	27/02/2019	33880	65 ANNI	2019001529	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale. escissione di marischi cutanee

1	27/02/2019	30108	57 ANNI	2019001520	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .recidivo per pregressa prolassotomia nel 2013 Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di marischi cutanee

1	13/03/2019	34618	43 ANNI	2019001824	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a $\zeta V\zeta$ e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso esi procede alla STARR secondo Longo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	13/03/2019	33929	53 ANNI	2019001834	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	13/03/2019	32797	51 ANNI	2019001829	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	13/03/2019	36623	50 ANNI	2019001836	565.0 - RAGADE ANALE	49.99 - ALTRI INTERVENTI SULL'ANO
---	------------	-------	---------	------------	----------------------	-----------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

reperto di ragade anale posteriore con pregresso ascesso.escissione della ragade con elettrobisturi garza fibrillare in sede

1	27/03/2019	25254	53 ANNI	2019002131	V44.3 - PRESENZA DI COLOSTOMIA	46.52 - CHIUSURA DI ORIFIZIO ARTIFICIALE DELL'INTESTINO CRASSO
---	------------	-------	---------	------------	--------------------------------	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Paziente in posizione ginecologica in anestesia generale si procede alla esplorazione e al controllo della tenuta della pregressa plastica della parete posteriore della vagina e anteriore del retto per fistola retto-vaginale. Negativa l'ispezione e l'esplorazione bimanuale retto- anale. Previo posizionamento di lunghetta in vagina si introducono mediante Foley oltre 100 cc di fisiologica e blu di metilene nel retto; la retrazione della lunghetta non evidenzia passaggio del colorante in vagina così come negativa risulta la successiva ispezione della cicatrice. Incisione a losanga pericostomica sn. Isolamento del moncone colico afferente ed efferente della colostomia temporanea dal piano muscolo-fasciale. Confezionamento di anastomosi latero-laterale meccanica anisoperistaltica con Echelon Flex 60 mm carica tissutale blu e sua terminalizzazione con lo stesso strumento. Controllo dell'emostasi sulla rima di sutura a punti staccati. Chiusura della parete per strati in vicryl, sottocute in monocryl, cute in nylon 3\0 a punti staccati

1	27/03/2019	33930	46 ANNI	2019002136	574.00 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti litiasica normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	27/03/2019	16579	48 ANNI	2019002138	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di III Grado sintomatico per ODS.con digitazione e defecazione frammentata
Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 6 +Iricriche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	29/03/2019	37420	70 ANNI	2019002201	574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,CON OSTRUZIONE	51.22 - COLECISTECTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	---	-------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

incisione mediana xifo sottoombelicale . Alla apertura della cavità peritoneale si rileva la presenza di abbondante versamento ematico con abbondanti coaguli disposti in sede sottoepatica e periepatica . La milza appare in sede e indenne. . Dopo rimozione dei coaguli si evidenzia la presenza di calcoli liberi disposti nell'omento sottostante ; la colecisti appare perforata sulla parete anteriore con gemizio ematico dai bordi della lesione di continuo dalla quale emerge la superficie di un voluminoso calcolo intraluminali Rimozione di numerosi coaguli all'interno della colecisti . Si procede alla viscerolisi pericolecistica fino a individuare il dotto cistico e la arteria cistica che vengono sezionati tra lacci . Colecistectomia anterograda . Ulteriore lavaggio della cavità peritoneale con drenaggio di coaguli residui della pelvi Controllo dell'emostasi del letto colecistico con falda emostatica fibrillare . Posizionamento di tubo di drenaggio Black Drain 24 in sede sottoepatica . Sintesi della parete per piani . Cute in filo

1	10/04/2019	34160	38 ANNI	2019002429	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale. escissione di ragade anale posteriore

1	10/04/2019	8641	68 ANNI	2019002438	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	10/04/2019	34418	51 ANNI	2019002433	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario sanguinante . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	10/04/2019	30602	56 ANNI	2019002425	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.
alla esplorazione rettale con cad si evidenzia una lieve riduzione de31 prollasso rettale segnalto preoperatoriamente si opta per intervento di prolassectomia secondo Longo con PPH01.emostasio con punti transsfissi.zaffo vasellinato in sede

1	17/04/2019	34161	61 ANNI	2019002584	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione inguinale obliqua sinistra. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Si reperta voluminosa ernia inguinale obliqua esterna da scivolamento. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento in addome emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene secondo la tecnica di Trabucco. Chiusura a strati della parete. Cute in Nylon

1	17/04/2019	34389	38 ANNI	2019002586	574.01 - CALCOLOSI DELLA COLECISTI CON COLECISTITE ACUTA,CON OSTRUZIONE	51.23 - COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	---------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione lenta dello pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm e sottovisione di un secondo e terzo trocar da 5 mm rispettivamente in epigastrio ed ipocondrio dx. Colecisti normodistesa con pareti regolari, isolamento e sezione su clips del dotto cistico di calibro regolare, e dell'arteria cistica. Colecistectomia. Controllo dell'emostasi. Chiusura delle brecce per piani. Cute in filo.

1	17/04/2019	12148	69 ANNI	2019002588	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele che fuoriesce dal CAD con prollasso rettale e si procede alla STARR secondo Longo con Doppia PPH 03 anteriore e 01 Posteriore; previo scposizionecon 6 punti a paracadute per consolidamento del prollasso e. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vasellinato nel retto.

1	01/05/2019	37906	57 ANNI	2019002803	865.04 - TRAUMATISMO DELLA MILZA,SENZA MENZIONE DI FERITA APERTA IN CAVITÀ, MASSIVA DISTRUZIONE PARENCHIMALE	41.5 - SPLENECTOMIA TOTALE
---	------------	-------	---------	------------	--	----------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Incisione xifo sottoombelicvale con escissione della pregressa cicatrice con difette della fascia addominale e piccole laparoccele .reperito di emoperitoneo con sanguiew libero e coagule con numerosi aderenze dal pregresso intervento.reperito di rottura della milza si procele alla aspirazione del sangue e i coaguli con splenectomia con l'ausilio del Legasure ,emostasi.toilet del cavo peritoneale.drenaggi in loggia splenica e nello scavo del douglas.sintesi dei tessuti

1	21/05/2019	35062	80 ANNI	2019003172	550.90 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Incisione inguinale obliqua dx. Apertura della aponeurosi del muscolo obliquo esterno. Liberazione ed apertura del funicolo con reperto di ernia inguinale obliqua esterna. Isolamento del sacco erniario, riduzione dello stesso e posizionamento di un plug. controllo dell' emostasi. Plastica erniaria con mesh in prolene. Chiusura a strati della parete. Sutura della cute con nylon 00

1	21/05/2019	36224	54 ANNI	2019003050	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	22/05/2019	33883	54 ANNI	2019003193	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di maresche cutanee

1	22/05/2019	31978	53 ANNI	2019003197	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di voluminoso rettocele che fuoriesce dal CAD e rende necessario l'utilizzo della Transtar; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 60mm carica blu, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n°5 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3/0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	22/05/2019	36588	47 ANNI	2019003202	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.escissione di maresche cutanee

1	22/05/2019	34292	38 ANNI	2019003203	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario di III grado . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	22/05/2019	36586	34 ANNI	2019003205	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .
Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	29/05/2019	17819	59 ANNI	2019003341	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

paz operata per POPS+transtar il 05/10/2016 reperto di voluminoso enterocele Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico sul promontorio a preparare il retto posteriormente e lateralmente a destra, continuando anteriormente sulla parete posteriore della vagina, esposta con tampone endovaginale. Preparazione della mesh in prolene (circa 5 x 12 cm) e suo fissaggio con due continue sulla parete posteriore della stessa e sulla cupola da un lato e dall'altro sul promontorio sacrale con protac . Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	29/05/2019	37658	58 ANNI	2019003355	618.04 - RETTOCELE	48.74 - RETTO-RETTOSTOMIA
---	------------	-------	---------	------------	--------------------	---------------------------

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Reperto di discreto rettocele di 6cm sintomatico per ODS.

Posizionamento di CAD; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e scomposizione dello stesso con due Echelon 45mm carica verde, si esegue Retto-Retto Anastomosi Transanale con Contour Transtar utilizzando n° 7 ricariche. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto

1	29/05/2019	35737	59 ANNI	2019003348	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.asportazione di9 polipo rettale

1	29/05/2019	16744	51 ANNI	2019003347	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	11/06/2019	36225	50 ANNI	2019003593	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Paziente in posizione ginecologia, dopo adeguato massaggio sfinteriale per lieve ipertono sfinteriale si esegue anosopia con anoscopio fenestrato operativo con reperto di ragade anale posteriore. Escissione della ragade per elettrocoazione, controllo emostasi. Medicazione a piatto

1	11/06/2019	36144	37 ANNI	2019003601	565.1 - FISTOLA ANALE	49.12 - FISTULECTOMIA ANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	-----------------------------

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Paziente in posizione ginecologica, presenza di orificio fistoloso esterno ad ore 6, cannulamento con specillo per evidenziare fistola transfinterica bassa interessante la porzione sottocutanea dello SAE. Fistulectomia su specillo e controllo emostasi, zaffo iodoformico in cavità, medicazione a piatto

1	12/06/2019	36361	68 ANNI	2019003633	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di voluminoso prolasso emorroidario di III,IV grado sanguinante vcircumferenziale . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	12/06/2019	35552	60 ANNI	20190003634	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	-------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	12/06/2019	36615	47 ANNI	2019003635	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	12/06/2019	2098	41 ANNI	2019003636	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario .

Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	13/06/2019	36579	59 ANNI	2019003657	618.6 - ENTEROCELE VAGINALE CONGENITO O ACQUISITO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (S.NEPI):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale per introdurre trocar da 12 mm e sotto visione di 2°, 3° e 4° tracers rispettivamente da 12 mm in fianco dx e da 5 mm in Fianco sn ed ipogastrico. Apertura del retroperitoneo dal promontorio sacrale per mobilizzare il metto sino in pelvi e quindi apertura del peritoneo prevaginale. Fissaggio di rete di prolene 5 x 10 cm alla parete posteriore della vagina ed alla cupola con punti staccati di prolene n° 1 ed al sacro con Protack. Controllo dell'emostasi e riperitoneizzazione con Stratafix. Chiusura con PDS delle brecce dei trocars da 12 mm, cute in nylonb.

1	14/06/2019	28646	71 ANNI	2019003645	565.1 - FISTOLA ANALE	49.01 - INCISIONE DI ASCESSO PERIANALE
---	------------	-------	---------	------------	-----------------------	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

REPERTO DI ASCESSO PERIANALE DESTRO A FERRO DI CAVALLO Incisione radiale centrata dallo sbocco della fistola perineale ad ore 7 con fuoriuscita di materiale puruloide, delicato curettage della cavita con fuoriuscita di peli, lavaggio della cavità con H2O2 e zaffatura con garza iodoformica.

1	26/06/2019	35714	51 ANNI	2019003929	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di rettocele con prolasso rettale che rende necessario l'utilizzo della starr; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi STARR secondo lungo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore. Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	26/06/2019	35327	37 ANNI	2019003939	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	26/06/2019	34958	35 ANNI	2019003942	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	-------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale. escissione di maresche cutanee

1	27/06/2019	33574	66 ANNI	2019003956	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a "V" e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

1	27/06/2019	34472	51 ANNI	2019003960	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	-------	---------	------------	---	---

Blocco : 1 - BO VALDELSA

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore, esposto con tampone endovaginale. Preparazione della mesh a ζV_{ζ} e suo fissaggio con punti staccati di Prolene 1. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Posizionamento di CAD. Reperto di prolasso rettale con rettocele ; previo posizionamento di 6 punti a paracadute per consolidamento del prolasso e , si esegue Retto-Retto Anastomosi STARR secondo lomngo con doppia PPH 03 anteriore e 01 posteriore . Emostasi sulla linea di sutura in Vicryl 3\0. Zaffo vaselinato nel retto.

1	29/06/2019	38915	88 ANNI	2019003987	540.9 - APPENDICITE ACUTA SENZA MENZIONE DI PERITONITE,PERFORAZIONE O ROTTURA	47.01 - APPENDECTOMIA LAPAROSCOPICA
---	------------	-------	---------	------------	---	-------------------------------------

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Induzione di pneumoperitoneo mediante accesso open periombelicale, posizionamento di Trocar da 12 mm e sotto visione di 2° e 3° Trocar da 5 mm rispettivamente in FIS e sovrapubico. Reperto di appendicite acuta flemmonosa. Esplorazione di utero e degli annessi che risultano nella norma.

Sezione del mesenterio appendicolare mediante pinza bipolare. Appendicectomia con chiusura del moncone su doppio laccio di PDS. Controllo emostasi. Chiusura della breccia ombelicale in PDS. Cute in filo

1	18/07/2019	35518	50 ANNI	2019004372	550.91 - ERNIA INGUINALE MONOLATERALE O NON SPECIFICATA,RICORRENTE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.05 - RIPARAZIONE MONOLATERALE DI ERNIA INGUINALE CON INNESTO O PROTESI, SAI
---	------------	-------	---------	------------	--	--

Note d'Intervento - Utente (M.RUSSO):

Incisione inguinale sovra la pregressa incisione. Apertura difficoltosa per le tenaci aderenze della aponeurosi del muscolo obliquo esterno ; si reperta ernia inguinale diretta. Isolamento del sacco erniario e suo affondamento;posizionamento di plug nell'orificio erniario e plicatura in Vicryl della fascia trasversalis.

Plastica erniaria con mesh in prolene. Controllo emostasi e chiusura a strati della parete. Cute in nylon.

1	18/07/2019	7622	47 ANNI	2019004375	455.2 - EMORROIDI INTERNE CON ALTRE COMPLICAZIONI	49.49 - ALTRI INTERVENTI SULLE EMORROIDI
---	------------	------	---------	------------	---	--

Note d'Intervento - Utente (A.KHADER):

Posizione litotomica, posizionamento di CAD da 33 mm fissato alla cute perianale con 4 punti di sutura, reperto di prolasso emorroidario . Confezionamento di borsa di tabacco con prolene 2/0 a 2 cm dall' apice delle emorroidi Introduzione di suturatrice meccanica PPH03 ed azionamento della suturatrice. Punti di emostasi in Vycril, tampone riassorbibile nel canale anale.

1	01/08/2019	36146	70 ANNI	2019004579	553.1 - ERNIA OMBELICALE,SENZA MENZIONE DI OSTRUZIONE O GANGRENA	53.41 - RIPARAZIONE DI ERNIA OMBELICALE CON PROTESI
---	------------	-------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (M.RANALLI):

Incisione cutanea laterombelicale destra. Presenza di ernia intasata non riducibile a contenuto omentale. Isolamento del sacco erniario, sua apertura, liberazione dell'omento, controllo dell'emostasi e sua riduzione in addome. Creazione di uno spazio properitoneale adeguato e posizionamento di "Ventralex M" fissata circonferenzialmente con punti staccati di prolene 2/0. Controllo dell'emostasi. Ciusura trasversale della fascia con PDS 1. Asportazione della cicatrice ombelicale non più vitale dopo liberazione del sacco. Sottocute e cute in filo.

Totale Interventi per Reparto: 828

Reparto : 3712 - OSTETRICA E GINECOLOGIA ELSA

N. Posiz.	Data Int.	Paziente	Età	Nosologico	1° Diagnosi ICD-9-CM	1° Procedura Chirurgica ICD-9-CM
-----------	-----------	----------	-----	------------	----------------------	----------------------------------

1	20/07/2015	6283	75 ANNI	2015004752	618.3 - PROLASSO UTERO-VAGINALE,COMPLETO	70.77 - SOSPENSIONE E FISSAZIONE DELLA VAGINA
---	------------	------	---------	------------	--	---

Note d'Intervento - Utente (C.FERRETTI):

Induzione del pneumoperitoneo con accesso open periombelicale posizionando un primo trocar da 12 mm. Sotto visione si introducono un secondo e terzo trocar in fianco destro e sinistro rispettivamente di 12 mm e 5 mm. Apertura del peritoneo pelvico anteriore tra vagina e vescica preparando il fornice anteriore. Preparazione della mesh a $\&\#147;V\&\#148;$ e suo fissaggio con due semicontinue al fornice. Preparazione del tunnel properitoneale bilateralmente e sospensione secondo la tecnica POPS, fissando i due estremi della rete alla fascia del muscolo obliquo esterno sopra le spine iliache. Chiusura in continua del peritoneo pelvico. Controllo dell'emostasi. Sintesi degli accessi per piani. Cute in filo.

Blocco : 1 - BO VALDELSA

1	23/11/2015	13737	55 ANNI	2015007205	618.01 - CISTOCELE, DELLA LINEA MEDIANA	54.21 - LAPAROSCOPIA
Note d'Intervento - Utente (A.FAVA):		Incisione periombelicale con l'introduzione del primo trocar in open, creazione dello pneumoperitoneo e introduzione di due trocar accessori. Reperto di numerose e tenaci aderenze delle anse ileo regionali, dell'omento e della vescica e gli annessi con la parete vescicale dovute a pregressi interventi annessiali. Si procede a lisi di dette aderenze che risulta particolarmente difficoltosa. La parete vescicale appare disepitelizzata ed estremamente friabile con alcune lacerazioni controllate con il blu di metilene che rendono necessario di procedere in open. Incisione ombelico pubica su vecchia cicatrice che viene escissa. Aperta la parete addominale si procede alla sutura della parete vescicale con ulteriore controllo con il blu di metilene. Si soprassiede pertanto all'intervento programmato di sospensione della vescica con tecnica sec. Pops. Accurata emostasi. Drenaggio nel Douglas. Chiusura per piani della parete addominale. Catetere vescicale a permanenza per 10 gg.				
1	29/11/2015	13737	55 ANNI	2015007205	569.83 - PERFORAZIONE DELL'INTESTINO	54.12 - RIAPERTURA DI LAPAROTOMIA RECENTE
Note d'Intervento - Utente (C.FERRETTI):		Incisione ombelico pubica sulla pregressa cicatrice.apertura della cavita addominale.reperto di peritonite circoscritta di tipo enterico da piccola perforazione di ansa ileale.sutura dell'ansa perforata con punti di vicryl.emostasi, lisi aderenziale. controllo delle anse ileali e digiunali che risultano nella norma, lavaggio della cavità peritoneale con soluzione fisiologica e betadine.drenaggio addominale nello scavo pelvico.sutura a strati della parete addominale				

Totale Interventi per Reparto: 3

Reparto : 4302 - UROLOGIA ELSA

N. Posiz.	Data Int.	Paziente	Età	Nosologico	1° Diagnosi ICD-9-CM	1° Procedura Chirurgica ICD-9-CM
1	18/09/2018	33634	10 ANNI	2018005477	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
Note d'Intervento - Utente (G.BENAIM):		Previa posizionamento di pomata anestetica (emla) sul/nel prepuzio, si esegue circoncisione per fimosi serrata. Si dilata il prepuzio e si espone il glande quindi si procede a circoncisione. Emostasi accurata. Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid 4.0. Medicazione con Gentalyn crema.				
1	06/11/2018	31767	7 ANNI	2018006509	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
Note d'Intervento - Utente (G.BENAIM):		Previa locoanestesia con pomata anestetica, si esegue circoncisione per fimosi serrata. Emostasi. Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid. Medicazione con Gentalyn crema.				
1	11/12/2018	31829	10 ANNI	2008007297	605 - PREPUZIO ESUBERANTE E FIMOSI	64.0 - CIRCONCISIONE
Note d'Intervento - Utente (G.BENAIM):		Previa infiltrazione locale di Lidocaina 2% alla base del pene, si esegue circoncisione per fimosi. Emostasi. Punti di sutura muco-cutanei semplici in vicryl rapid. Medicazione con Gentalyn crema.				

Totale Interventi per Reparto: 3

Totale Interventi per Blocco: 834